

فايكو

المجموعة :
Carbamate

بروبوريد - ٢, ٧٢٪



مبيد فطري زراعي سام
مركز قابل للذوبان

مبيد فطري جهازى له تأثير وقائى وعلاجى لمقاومة فطريات التربة والعديد من الأمراض الفطرية على المحاصيل الواردة في جدول الاستعمالات.

التركيب : كل لتر يحتوي على :

بروباموكارب هيدروكلوريد ٧٢,٢ ٪ و/ح (مادة فعالة)

الخواص :

بروبوريد - ٧٢,٢ ٪ : مبيد فطري جهازى له تأثير وقائى وعلاجى لمقاومة فطريات التربة والعديد من الأمراض الفطرية على المحاصيل الواردة في جدول الاستعمالات.
بروبوريد - ٧٢,٢ ٪ : له فعالية تدوم من ٣ - ٨ أسابيع وذلك حسب طريقة الاستعمال، الظروف الجوية ونوع التربة وينصح باستعماله بشكل مبكر ووقائى.
بروبوريد - ٧٢,٢ ٪ : خفيف السمية للنحل والأسماك.

الاستعمالات :

فترة الأمان (أيام)	معدل الاستعمال	المرض	المحصول
٧ عدا الملقوف ١٤	<p>معاملة البذور: يضاف محلول الرش (٧٠ مل / ٢٠ لتر ماء) بعد الزراعة مباشرة الى التربة بمعدل ٢-٤ لتر من المحلول / ٢م.</p> <p>معاملة الأشتال: • قبل نقل الأشتال: يضاف محلول الرش (٧٠ مل / ٢٠ لتر ماء) الى التربة بمعدل ٢-٤ لتر من المحلول / ٢م. • بعد نقل الأشتال: يضاف المحلول ٢٠ مل / ٢٠ لتر الى التربة بمعدل ٢٠٠ مل من المحلول / شتلة (ويعاد الرش كل اسبوعين عند الحاجة).</p> <p>الرش الورقي: ٣٠ مل / ٢٠ لتر ماء</p>	عضن الجذور: (بيثيوم، فيتوفثورا) البياض الزغبى اللفحة المتأخرة: (فيتوفثورا)	البندورة، الملقوف، الفضل والبطاطا.
٣	<p>معاملة البذور: يضاف محلول الرش (٧٠ مل / ٢٠ لتر ماء) بعد الزراعة مباشرة الى التربة بمعدل ٢-٤ لتر من المحلول / ٢م.</p> <p>معاملة الأشتال: • قبل نقل الأشتال: يضاف محلول الرش (٧٠ مل / ٢٠ لتر ماء) الى التربة بمعدل ٢-٤ لتر من المحلول / ٢م. • بعد نقل الأشتال: يضاف المحلول ٢٠ مل / ٢٠ لتر الى التربة بمعدل ٢٠٠ مل من المحلول / شتلة.</p> <p>الرش الورقي: ٥٠ مل / ٢٠ لتر ماء</p>	عضن الجذور: (بيثيوم، فيتوفثورا) البياض الزغبى	الخيار

• للحصول على معلومات عن الإسعافات الأولية والتحذيرات راجع الفهرس الخاص بذلك في نهاية الكتاب.

فايكو

فترة الأمان (أيام)	معدل الاستعمال	المرض	المحصول
---	نفس الطريقة السابقة لمعاملة البذور والأشتال <u>العقل</u> ، يضاف المحلول (٥-١٥ مل / ١٠ لتر) الى التربة بمعدل ٥-١٠ لتر من المحلول / ٢م	عفن الجذور: (بيثيوم، فيتوفثورا)	نباتات الزينة

تحذير :

لا يستعمل المبيد إلا على المحاصيل الواردة في جدول الاستعمالات مع مراعاة فترات الأمان قبل عملية القطف.

فترة تحريم دخول الحقل المرشوش :

يجب عدم دخول الحقل المرشوش قبل مرور ٢٤ ساعة على آخر معاملة رش.

قابلية الخلط :

قابل للخلط مع معظم المبيدات الفطرية والحشرية ولا يخلط مع الأسمدة المذابة في الماء ويفضل استعمال المبيد فوراً بعد الخلط وينصح بعمل تجربة خلط مصغرة قبل الرش.

* تراكيب اخرى : بروبانوفاب - ٧٢,٢% .

• للحصول على معلومات عن الإسعافات الأولية والتحذيرات راجع الفهرس الخاص بذلك في نهاية الكتاب.