

فابكو

المجموعة :  
Pyrethroid

بوكسر - ٣٠٪

مبيد حشري زراعي سام  
مركز قابل للإستحلاب



مبيد حشري يعمل عن طريق الملامسة والمعدة لمكافحة العديد من الحشرات على المحاصيل الزراعية الواردة في جدول الاستعمالات.

التركيب : كل لتر يحتوي على :

٣٠٪ و/ح (مادة فعالة)

ايتوفينبروكس

الخواص :

بوكسر ٣٠٪ : مبيد حشري ذو كفاءة عالية وقتل سريع في مكافحة العديد من الحشرات من رتبة غمدية ونصفية وحرشفية ومستقيمة الأجنحة.

الاستعمالات :

المحصول	الآفة	معدل الاستعمال / ٢٠ لتر ماء	فترة الامان (أيام)
الحمضيات، التفاح، الدراق، العنب والزيتون	عثة الثمار، عثة هريان العنب، المن.	١٣,٢ - ٦,٦ مل	١٤
	صانعات انفاق الحمضيات، البسيلا، البق، المن.	١٠ - ٥ مل	
فول الصويا.	المن، حفار القرون، ديدان البراعم، البق، الحفارات، الخنافس.	٥ - ٢,٥ مل	١٤
الملفوف، الخيار، الباذنجان، البتدورة.	عثة الظهر الماسي، الديدان القارضة، دودة أوراق الملفوف، من الدراق الأخضر، المن.	٥ - ٢,٥ مل	٣
الذرة.	حفار الساق، الديدان القارضة، المن.	٦,٦ - ٣,٣ مل	٧
البطاطا	المن، الديدان القارضة.	٦,٦ - ٣,٣ مل	٧
الدخان	المن، الديدان القارضة.	٦,٦ - ٣,٣ مل	---

تحذير :

عدم استعمال المبيد على المحاصيل غير الواردة في جدول الاستعمالات مع الإلتزام بفترات الأمان قبل عملية القطف.

فترة تحريم دخول الحقل المرشوش :

يجب عدم دخول الحقل المرشوش قبل مرور ٢٤ ساعة على آخر معاملة رش.

قابلية الخطأ :

قابل للخلط مع معظم المبيدات الفطرية والحشرية وينصح بعمل تجربة خلط مصغرة مع المبيدات الاخرى قبل الرش.

• للحصول على معلومات عن الإسعافات الأولية والتحذيرات راجع الفهرس الخاص بذلك في نهاية الكتاب.