

فايكو

الجموعة :  
Pyrethroid

بيفيثامين-١٠٪

مبيد حشري وللحلم زراعي سام  
مركز قابل للإستحلاب



مبيد حشري وللحلم يعمل بالملامسة ذو أثر متبقي وذو فعالية عالية لمكافحة الآفات الحشرية والحلم ويستخدم كعلاج وقائي ويمكن تطبيقه على فترات منتظمة ويمتاز بسرعه العالیه في القتل عندما يرش قبل أن تصل أعداد الآفات لمستويات ضارة.

التركيب: كل لتر يحتوي على :

١٠٪ و/ح (مادة فعالة)

بيفيثامين

الخواص:

بيفيثامين-١٠٪: مبيد حشري وللحلم بايرثرويدي يعمل عن طريق التأثير على وظائف الجهاز العصبي للحشرة. بيفيثامين-١٠٪: مبيد فعال ضد مجموعة واسعة من الآفات على المحاصيل الزراعية المذكورة في جدول الاستعمالات.

الاستعمالات:

المحصول	الآفة	معدل الاستعمال ٢٠ / لتر ماء	فترة الأمان (أيام)	ملاحظات
القول، البرسيم، الشعير، البازيلاء، الترمس، القمح.	الحلم، الديدان القارضة.	١-٢ مل	٤ أسابيع (الرعي)	-----
الدراق، النكتارين، الخوخ، المشمش.	الخنافس	١٠ مل	١	يجب إعادة الرش بعد ١٠ أيام من تاريخ آخر رش.
الحمضيات	يرقات السوس.	قبل ظهور الحشرة ١٢,٥-٢٥ مل/ للشجرة الواحدة.  بعد ظهور الحشرة برنامج المراقبة ٦ مل/ للشجرة الواحدة.	---	حجم المحلول الكلي من ٥ - ١٠ لتر/ الشجرة الواحدة برنامج ما قبل ظهور الحشرة: الرش قبل أو عند ظهور أول علامات الإصابة بالسوس في وسط شهر أكتوبر.  برنامج ما بعد ظهور الحشرة: عند ظهور السوس في شهري أكتوبر/ نوفمبر متابعة العلاج عندما تصل ٢٥ حشرة/ ١٠ أماكن للبلستان الواحد.
العنب	يرقات الخنافس.	٢٠٠ مل	---	يجب أن يكون الرش في نهاية فترة السكون بعد التلقيح وقبل التبرعم.
الأجاص	البق الدقيقي.	٥ مل مع الزيت الصيفي "سمرول" (١ لتر / ١٠٠ لتر)	١٤	يجب الرش عندما تظهر صفار الحوريات في الربيع.
البنندورة	الحلم، الديدان.	١٢ مل	١	يجب عدم الرش عندما تصل يرقات دودة الحبوب لأطول من ٥ ملم.
	الذباب البيضاء	٦ مل		

• للحصول على معلومات عن الإسعافات الأولية والتحذيرات راجع الفهرس الخاص بذلك في نهاية الكتاب.

# فابكو

## تحذير :

عدم استعمال المبيد على المحاصيل غير الواردة في جدول الاستعمالات مع الإلتزام بفترات الأمان قبل عملية القطف.

## فترة تحريم دخول الحقل المرشوش

يجب عدم دخول الحقل المرشوش قبل مرور ٤٨ ساعة على آخر معاملة رش.

## قابلية الخطأ :

يمكن خلطه مع معظم المبيدات ما عدا القلوية منها وينصح بعمل تجربة خلط مصغرة قبل الرش.