

فايكو

الجموعة :
Triazine

تريفاب - ٧٥٪



مبيد حشري زراعي سام
(منظم لنمو الحشرات IGR)
مسحوق قابل للبلل

منظم لنمو الحشرات يعمل بالملامسة خلال عمليات الانسلاخ والتعذر ويعمل كمبيد جهازي لمكافحة عدد كبير من الحشرات التي تصيب المحاصيل الزراعية.

التركيب : كل كغم يحتوي على :

٧٥٪ و/و (مادة فعالة)

سايرومازين

الخواص :

تريفاب - ٧٥٪ : مثبط لنمو الحشرات عن طريق الملامسة خلال عمليتي الانسلاخ والتعذر، ويعمل كمبيد جهازي عند تغذية البرقات على النبات من خلال انتشاره داخل أوعية الورقة عن طريق الرش الخضري وعن طريق الجذور.

تريفاب - ٧٥٪ : لا يقضي على الحشرات الكاملة ولكنه يحد من تكاثرها من خلال اضعاف قدرة التنقيس لديها واصابة بيوضها بالعقم الجزئي .

تريفاب - ٧٥٪ : يستخدم عن طريق الرش الخضري لمكافحة صناعات الأنفاق على المحاصيل الواردة في جدول الاستعمالات.

الاستعمالات :

المحصول	الآفة	معدل الاستعمال / ٢٠٠ لتر ماء	فترة الامان
الحقول المفتوحة : الكوسا، القرع، الفاصولياء، البازيلاء، الشمام، البطيخ، الخس، البقدونس، الجزر، البصل، الفلفل، البندورة، الباذنجان، البطاطا.	صناعات الانفاق	٢٥-٣٥ غم تبدأ المعالجة عند ظهور الآفات ويرش بمعدل ٥٠ لتر/دونم ويكرر الرش كل ١٠-٧ أيام اذا دعت الحاجة.	٣ أيام لكل من : البندورة، الخيار، الباذنجان، البطيخ، الشمام، الكوسا، القرع.
داخل البيوت البلاستيكية : البندورة، الخيار، الفلفل، الباذنجان، الفراولة ونباتات الزينة.			١٤ يوم لكل من : البازيلاء، الفاصولياء، الجزر، الخس، الفلفل، البطاطا والبصل، البقدونس، الفراولة.

دونم = ١٠٠٠ م^٢

تحذير :

عدم استعمال المبيد على المحاصيل غير الواردة في جدول الاستعمالات مع الالتزام بفترة الامان قبل عملية القطف.

ملاحظة : لا يمكن استخدامه خلال شبكات الري.

فترة تعريم دخول الحقل المرشوش : يمنع دخول الحقل المرشوش قبل مرور ٢٤ ساعة على آخر معاملة رش .

قابلية الخلط : قابل للخلط مع العديد من المبيدات المعروفة لكن خلطه مع المركبات القلوية مثل الكبريت الكلسي أو مركبات النحاس تسبب قلة في الفعالية وفي حالة الخلط بعمل تجربة رش مصغرة قبل الرش على نطاق واسع.

• للحصول على معلومات عن الإسعافات الأولية والتحذيرات راجع الفهرس الخاص بذلك في نهاية الكتاب.