

فابكو

المجموعة:

Isoxazole

تشجازول - ٣٠٪



مبيد فطري زراعي سام
سائل مركز قابل للذوبان

مبيد فطري جهازي ذو مجال واسع للقضاء على الفطريات التي تصيب المحاصيل الواردة في جدول الإستعمالات.

التركيب : كل لتر يحتوي على :

٣٠٪ و/ح (مادة فعالة)

هيمكسازول

الخواص :

- تشجازول - ٣٠٪: يقضي على فطريات التربة ويؤمن حماية للنبات.
- تشجازول - ٣٠٪: مبيد فعال ضد أمراض الذبول.
- تشجازول - ٣٠٪: مبيد ذو تأثير مزدوج علاجي وقائي.
- تشجازول - ٣٠٪: لا يتجمع في التربة.
- تشجازول - ٣٠٪: مبيد يستعمل بعد الزراعة مباشرة أو بعد التشتيل.

الاستعمالات :

يستعمل تشجازول - ٣٠٪ لمكافحة فطريات التربة التي تسبب ذبول الأشتال وخاصة الناجمة عن البيثيوم والفيوزاريوم

المحصول	المرض	نسبة الاستعمال و الحل	الإضافة
الخيار، البطيخ، السبانخ، البازيلاء.	الفيوزاريوم، البيثيوم.	١ : ٥٠٠ الى ١ : ١٠٠٠ أي من ٢٠ مل - ٤٠ مل / لتر ماء	- سقاية بعد الزراعة مباشرة أو بعد التشتيل. - الفيوزاريوم تكرر العملية، أما البيثيوم فيكفي مرة واحدة.
نباتات الزينة.	أمراض الذبول.	١ : ٥٠٠ الى ١ : ١٠٠٠ أي من ٢٠ مل - ٤٠ مل / لتر ماء	سقاية بعد الزراعة مباشرة.
مشاتل الغابات.	أمراض الذبول.	١ : ٥٠٠ الى ١ : ١٠٠٠ أي من ٢٠ مل - ٤٠ مل / لتر ماء	سقاية بعد زراعة البذور و تغطيتها بالتربة.

تحذير : عدم استخدام المبيد إلا على المحاصيل المذكورة في جدول الاستعمالات مع الالتزام بفترات الأمان قبل عملية القطف.

فترة تحريم دخول الحقل المرشوش :

يجب عدم دخول الحقل المرشوش قبل مرور ٢٤ ساعة على آخر تطبيق.

قابلية الخلط : قابل للخلط مع معظم المبيدات الأخرى وينصح بعمل تجربة خلط مصغرة قبل التطبيق.

• للحصول على معلومات عن الإسعافات الأولية والتحذيرات راجع الفهرس الخاص بذلك في نهاية الكتاب.