



**فابكو**

المجموعة:  
Pyrimidine  
Carbinol

# تكامول - ٤%

مبيد فطري زراعي سام / مركز قابل للاستحلاب

مبيد فطري جهازي علاجي ووقائي وابادي.

الغواص : كل لتر يحتوي على :

٤٪ و/ح (مادة فعالة)

فيناريومول

الغواص :

تكامول - ٤٪ : مبيد فطري جهازي علاجي ووقائي وابادي ضد البياض الدقيقى على المحاصيل الواردة في جدول الاستعمالات.

تكامول - ٤٪ : فاعليته ثابتة لا يتاثر بالأمطار أو درجات الحرارة العالية.

تكامول - ٤٪ : لا يؤثر على عمليات التقىح والعقد.

## الاستعمالات:

الفترة الآمان (أيام)	ملاحظات	معدل الاستعمال / لتر ماء	المرض	المحصول
١٤	يجب أن تكون كمية المياه المستعملة في الدونم الواحد ٢٠٠ - ١٥٠ لتر.	١٥ مل	البياض الدقيقى.	التفاح.
	يكسر الرش كل ١٤ يوم.	١٨ مل	الجرب.	
٤	يجب أن تكون كمية المياه المستعملة في الدونم الواحد ١٠٠ لتر.	٥ مل	البياض الدقيقى.	الخيار، البطيخ، الشمام، الكوسا، اليقظين.

**تحذير :** عدم استخدام المبيد إلا على المحاصيل المذكورة في جدول الاستعمالات مع الالتزام بفترات الآمان قبل عملية القطاف.

## ملاحظات :

• لا يستعمل المبيد تكامول - ٤٪ في أنظمة الري.

ليس له أي تأثير على البراعم أو الأوراق أو الشمار إذا استعمل حسب المعدل الموصى به. أما إذا استعمل بمعدل أعلى فقد ينتج عن ذلك تczم في الطرود ونمو غير طبيعي للأوراق واشتداد في الأخضرار.

## فترات تحرير دخول الحقل المرشوش:

يجب عدم دخول الحقل المرشوش قبل مرور ٢٤ ساعة على آخر معاملة رش.

**قابلية الخلط :** قابل للخلط مع معظم المبيدات، ينصح بعمل تجربة خلط مصغرة قبل الرش.

\* للحصول على معلومات عن الإسعافات الأولية والتحذيرات راجع الفهرس الخاص بذلك في نهاية الكتاب.