

فايكو

المجموعة:
Urea

تيفلون - ٥٠%

مبيد عشبي زراعي سام
مسحوق قابل للبلل



مبيد عشبي جهازي اختياري يمتص عن طريق الجذور والمجموع الخضري، وينتقل بشكل رئيسي عن طريق اوعية الخشب

التركيب : كل كغم يحتوي على :

٥٠% و/و (مادة فعالة)

ليتيرون

الخواص:

تيفلون - ٥٠% : يستعمل قبل او بعد الانبات لمكافحة الاعشاب الحولية والاعشاب الرفيعة والعريضة الاوراق وبعض الاعشاب المعمرة على عدد من المحاصيل وحسب جدول الاستعمال.

تيفلون - ٥٠% : خفيف السمية للثدييات.

تيفلون - ٥٠% : تظهر اعراض مكافحة وهي: اصفرار، تقزم ومن ثم موت للاعشاب بعد ١٠-١٤ يوم من آخر معاملة.

تيفلون - ٥٠% : ذو فعالية عالية في الظروف المثالية لنمو الاعشاب، وبالتالي فإن مكافحة الاعشاب تعتمد على نوعها ووقت مكافحة بالإضافة لظروف النمو.

الاستعمالات:

المحصول	الاعشاب	معدل الاستعمال (غم/دونم)	موعد الاستعمال	ملاحظات
الجزر	الاعشاب الحولية والاعشاب الرفيعة والعريضة الاوراق مثل: الاخوان، الديبق، القريص، الخردل البري، الهندباء البرية، عشبة الغليون، كيس الراعي، لبنين، الشوفان البري، قمح الفار.	٢٠٠ - ٣٠٠	قبل الانبات	يستعمل بعد الزراعة والري.
		١٥٠ - ٢٥٠	قبل الانبات	يستعمل عند ظهور الاوراق الحقيقية للاعشاب.

دونم=١٠٠٠م^٢

تحذير : يمنع استعمال المبيد على المحاصيل غير الواردة في جدول الاستعمالات.

ارشادات:

- يجب معايرة آلة الرش قبل الاستعمال.
- يتم احتساب الجرعة المستخدمة من المبيد بعد الانبات بالاعتماد على حجم الاعشاب والعصارة الموجودة فيها وعلى درجة تحمل المحصول.
- تقل فعالية المبيد عند استعماله في ظروف الجفاف، لذا يجب ان تحتوي التربة على نسبة جيدة من الرطوبة، وتجنب التغطية غير الجيدة عند الرش، بالإضافة لعدم الرش بوجود الرياح، ويجب عدم الرش عندما يكون المجموع الخضري مبتلا او اثناء سقوط الامطار او توقع هطولها لان الامطار الكثيفة بعد المعاملة قد تسبب اضرار للمحصول.
- تستخدم الجرعة الأدنى من المبيد في التربة الخفيفة والتربة الرملية، ويجب استعمال الجرعة الاعلى في التربة الثقيلة.
- تجنب المعاملة الكثيفة او المتكررة من المبيد لان ذلك من المحتمل ان يسبب اضرار للمحاصيل قليلة التحمل مثل (البصل، الثوم).

• للحصول على معلومات عن الاسعافات الأولية والتحذيرات راجع الفهرس الخاص بذلك في نهاية الكتاب.

فابكو

فترة تحريم الرعي للحيوانات:

يمنع رعي او تغذية الحيوانات في الحقل المرشوش لمدة لا تقل عن ٣ اشهر على آخر معاملة رش.

فترة تحريم دخول الحقل المرشوش:

يجب عدم دخول الحقل المرشوش قبل مرور ٢٤ ساعه على آخر معاملة رش.

قابلية الخلط:

يفضل عدم خلطه مع المبيدات الاخرى .

• للحصول على معلومات عن الإسعافات الأولية والتحذيرات راجع الفهرس الخاص بذلك في نهاية الكتاب.