



فاكو

المجموعة:

Organophosphate

تيموفاب - ٥٠%

مبيد حشري سام للصحة العامة

مركز قابل للإستحلاب

مبيد حشري غير جهازي يعمل على تثبيط نشاط الكولين استريليز في الحشرات التي تؤثر على الصحة العامة والبيئة في جدول الاستعمالات.

التركيب: كل لتر يحتوي على :

٥٠٪ و/ح (مادة فعالة)

تيميفوس

الغواص :

تيموفاب - ٥٠٪: يكافح يرقات الحشرات التي تعمل كعوازل لنقل أمراض الملاريا وحمى التيفوس والحمى الصفراء وغيرها *Anophels, Aedes, Culex, Simulium. Spp*.

تيموفاب - ٥٠٪: يستخدم لمكافحة البعوض وخاصة في أماكن تواجده في المياه الملوثة.

الاستعمالات :

| نوع المياه | الألفة | معدل الاستعمال من المبيد |
|--|---|--------------------------|
| مياه غير ملوثة | يكافح يرقات البعوض التي تعمل كعوازل لنقل مرض الملاريا مثل <i>(Anophels, Aedes, & Culex)</i> . | ٢ - ٣ مل / ٢٠ لتر ماء |
| مياه متوسطة التلوث | يكافح يرقات الذبابية السوداء <i>(Simulium. Spp)</i> التي تعمل كعوازل لنقل أمراض حمى التيفوس والحمى الصفراء. | ٤ - ٥ مل / ٢٠ لتر ماء |
| مياه عالية التلوث (تحتوي على نسبة عالية من المواد العضوية) | يكافح يرقات الذبابية السوداء <i>(Simulium. Spp)</i> التي تعمل كعوازل لنقل أمراض حمى التيفوس والحمى الصفراء. | ٨ - ٢٠ مل / ٢٠ لتر ماء |

فترة تحرير دخول المنطقة المعاملة: يمنع دخول المنطقة المعاملة قبل مرور ٤٨ ساعة من آخر معاملة.

فترة الأثر المتبقى طويل الأمد: تقريباً ٣ أيام.

قابلية الغلط: غير قابل للخلط مع المبيدات الأخرى.