

فابكو

الجموعة :
Gibberellins

جبروفاب - ١٠٪

منظم نمو نباتي
مسحوق قابل للذوبان



جبروفاب-١٠٪ من منظمات النمو النباتية (الجبريلينات) لكسر طور السكون و تحسين نوعية الثمار والتبكير في النضج وزيادة حجم الثمار مما يؤدي إلى زيادة الإنتاج .

التركيب: كل كغم يحتوي على :

١٠٪ و/و (مادة فعالة)

حامض الجبرلين

الخواص :

جبروفاب-١٠٪ : منظم نمو نباتي يستعمل على محاصيل الفاكهة والخضراوات والأزهار لكسر طور السكون وتحسين نوعية الثمار وتبكير النضج والتحكم في مواعيد القطف.

جبروفاب-١٠٪ : هرمون يعمل على زيادة استطالة الخلايا.

جبروفاب-١٠٪ : يزيد من حجم الثمار خاصة العنب عديم البذور كما يزيد من استطالة الساق لنباتات الزينة.
جبروفاب-١٠٪ : له اثر واضح في زيادة عقد الأزهار في أشجار الكلمنتينا والعنب عديم البذور.

الاستعمالات :

المواعيد	معدل الاستعمال (غم/ ١٠٠ لتر ماء)	الحصول
عندما يكون طول العنقود من ٧-١٠ سم (للاستطالة) . عند تزهير اغلب العناقيد (للخف). بعد تمام العقد مباشرة (زيادة حجم العنقود للحبة).	الرشة الأولى ١٠ الرشة الثانية ١٠ الرشة الثالثة ٤٠-٥٠	العنب النباتي (عديم البذور)
رشة واحدة في سبتمبر (للتأخير في القطف وتحسين الصفات للتصدير).	٢٠-٣٠	برتقال أبو صرة أو جريب فروت
رش الأشجار قبل التزهير لزيادة العقد وتقليل التساقط في شهر يوليو.	٣٠-٤٠	اليوسفي
عندما يكون حجم الثمرة نصف حجمها الطبيعي.	٢٥-٤٠	الليمون
قبل جمع المحصول بستة اسابيع (للتبكير وزيادة المحصول).	١٠-٢٠	الخرشوف
عند ٢٥٪ ازهار (زيادة العقد).	١٠-٢٠	الكثرى
بعد شهر من الزراعة (للتبكير وزيادة الإنتاج).	١٠	الضراولة
رشة واحدة لزيادة حجم الثمار.	٤٠	الموز

تحذير :

- يفضل رش المحلول في ذات يوم التحضير.
- يراعى زيادة التسميد الأزوتي والفوسفاتي بمقدار ٢٥٪ لحماية النبات من الإجهاد.
- الالتزام بمعدلات الاستعمال وعدم تجاوزها.

• للحصول على معلومات عن الإسعافات الأولية والتحذيرات راجع الفهرس الخاص بذلك في نهاية الكتاب.