

فايكو
المجموعة :
Gibberellins

جبروفاب - ٢%

منظم نمو نباتي
مركز قابل للذوبان



جبروفاب-٢% من منظمات النمو النباتية (الجبريلينات) لكسر طور السكون وتحسين نوعية الثمار والتبكير في النضج وزيادة حجم الثمار مما يؤدي الى زيادة الانتاج.

التركيب: كل لتر يحتوي على :

٢% و/ح (مادة فعالة)

حامض الجبرلين

الخواص :

جبروفاب -٢% : منظم نمو نباتي يستعمل على محاصيل الفاكهة والخضروات والازهار لكسر طور السكون وتحسين نوعية الثمار وتبكير النضج والتحكم في مواعيد القطف.

جبروفاب -٢% : هرمون يعمل على زيادة استطالة الخلايا.

جبروفاب -٢% : يزيد من حجم الثمار خاصة العنب عديم البذور كما يزيد من استطالة الساق لنباتات الزينة.

جبروفاب -٢% : له اثر واضح في زيادة عقد الازهار في اشجار الحمضيات والعنب عديم البذور.

جبروفاب -٢% : يستعمل لكسر طور السكون في البطاطا.

الاستعمالات :

- للرش بمعدل ٢٠٠ مل / ١٠٠ لتر ماء.
- لكسر طور السكون بمعدل ٢٠٠ مل/١٠٠ لتر ماء مع الغمر لمدة ٣ دقائق قبل الزراعة.

المحصول	دواعي الاستعمال	وقت المعاملة
العنب عديم البذور	لاستطالة العنقود	- قبل التزهير عندما يكون طول العنقود ٤-٨ سم. - عندما تكون نسبة التزهير ٥٠-٦٠٪.
	لزيادة حجم الثمار	عندما يكون قطر الثمرة ٣-٤ ملم.
	لتكوين ثمار متجانسة	بعد اسبوع من الرشة الثالثة.
عنب الزبيب	لتقليل العناقيد الثمرية	عندما تكون نسبة التزهير ٨٠-١٠٠٪.
الليمون	- لزيادة فترة نمو الليمون الاخضر. - للتحكم في فترة حصاد المحصول.	قبل تلون الثمار، عندما يكون حجم الثمار بنسبة ٧٥٪ من حجمها النهائي، يجب ان توقف المعاملة قبل شهر من الحصاد.
البرتقال	لزيادة فترة ما قبل الحصاد وتحسين نوعية القشرة الخارجية	قبل ١٥ يوم من تلون الثمار، يجب ان توقف المعاملة قبل ١٠ أيام من الحصاد.
المندرين	لزيادة عقد الأزهار	خلال مرحلة الأزهار.
الاجاص	- لتقليل فترة مرحلة الأزهار و للتبكير في عملية العقد. - لتقليل من الاصابة بالآفات. - لزيادة عقد الثمار وتحسين النوعية.	عند تفتح ٢٥٪ من الأزهار.
الفراولة	لزيادة عدد الماداد و بالتالي زيادة الانتاج.	بعد شهر من زراعة الشتلات.
الموز	- لزيادة حجم الثمار. - لزيادة نضارة الثمار وتحسين اللون.	- المعاملة الاولى عندما يكون عمر الفسيلة من ٣٠-٤٠ يوم. - المعاملة الثانية بعد ٧-١٥ يوم من المعاملة الاولى.
الكرز	- لتأخير عملية الحصاد. - لزيادة نضارة الثمار وتحسين اللون. - لزيادة حجم وصلابة الثمار.	عندما يكون لون الثمار اخضر مائل للصفرة (مع عمل تغطية كاملة للنبات).
ازهار القطف	- لزيادة استطالة الساق والقطر. - للتبكير في عملية الأزهار.	رش من ٢-٣ مرات في فصل الشتاء مرة واحدة قبل عملية الأزهار.

تحذير :

- الالتزام بمعدلات الاستعمال وعدم تجاوزها.
- يفضل رش المحلول في ذات يوم التحضير.

• للحصول على معلومات عن الاسعافات الأولية والتحذيرات راجع الفهرس الخاص بذلك في نهاية الكتاب.