

فابكو

المجموعة:
Glycine derivative

جراوند - أب

مبيد عشبي جهازى زراعى سام
مركز قابل للذوبان



مبيد جهازى غير اختياري لمكافحة العديد من الأعشاب الرقيقة والعريضة الأوراق مثل أعشاب السعد والشجيرات الخشبية الحولية والمعمرة.

التركيب: كل لتر يحتوي على :

٤٨% و/ح (مادة فعالة)

جلايفوسيت ايزوبروبيل أمين

(أو ما يعادل GLYPHOSATE ACID ٣٦% و/ح)

١٧%

مادة بيولوجية منشطة

الخواص:

جراوند-أب : يتميز بتركيبية خاصة تزيد فعاليته البيولوجية وتقلل نسبة الجرعة المستخدمة إلى النصف تقريبا.

جراوند-أب : مبيد عشبي جهازى غير اختياري يقوم بالقضاء على جميع الأعشاب الرقيقة والعريضة الأوراق والشجيرات الخشبية الحولية والمعمرة.

جراوند-أب : يمتص عن طريق المجموع الخضري وينتقل إلى الأجزاء السفلى للنبات وهي الجذور والرايزومات ويقضي على الأعشاب بشكل نهائي لأنه يعمل عن طريق الجذور.

جراوند-أب : لا يوجد للمبيد أي تأثير ضار على البيئة وفي حالة ملاسته للتربة يصبح عديم الفعالية لأنه سريع التحلل عن طريق البكتيريا.

جراوند-أب : لا تتأثر فعالية المبيد بدرجات الحرارة المنخفضة والحرارة الدافئة تزيد من فعاليته.

جراوند-أب : ليس له تأثير قبل الإنبات لذا يمكن زرع المحاصيل بعد معاملة الأرض.

الاستعمالات:

دواعي الاستعمال	معدلات الرش	وقت الرش
للقضاء على محصول سابق وزراعة محصول آخر	٥٠٠ - ٦٠٠ مل / ١٥ - ٢٥ لتر ماء / ١٠٠٠ م	عندما يصل طول النبات ٣٠ - ٦٠ سم وقبل الإزهار .
للقضاء على الأعشاب المعمرة والنجليات في حقول أشجار (الحمضيات، التفاح، الخوخ، المشمش، الدراق، الاجاص، النكتارين، الزيتون، العنب).	٦٠٠ - ١٠٠٠ مل / ١٠ - ٥٠ لتر ماء / ١٠٠٠ م	قبل الإزهار .
للقضاء على الأعشاب الرقيقة والعريضة في حقل غير معد للزراعة .	٦٠٠ - ١٠٠٠ مل / ١٠ - ٥٠ لتر ماء / ١٠٠٠ م	---

تحذيرات :

- عدم استخدام المبيد إلا على المحاصيل المذكورة في جدول الاستعمالات.

- عدم رش المبيد بواسطة مضخات الحديد المجلفنة (كاوي للحديد والمعادن المجلفنة).

الأعشاب المائية:

يرش عندما يكون طول النبات على الأقل ٣٠ سم وقبل فترة الإزهار بمعدل ٢٥٠-٦٠٠ مل/١٠-٣٠ لتر ماء.

• للحصول على معلومات عن الإسعافات الأولية والتحذيرات راجع الفهرس الخاص بذلك في نهاية الكتاب.

الشجيرات الخشبية :

يرش عندما يكون طول النبات على الأقل ٣٠ سم وقبل فترة الإزهار بمعدل ٧٥-٧٠ مل / ١٠٠٠ م^٢ حسب نمو النبات وكثافته وحسب الظروف الجوية في وقت المعاملة.

إرشادات :

- تتم عمليات الرش بواسطة مضخات مصنوعة من البلاستيك أو فيبر جلاس أو مضخة تقليدية غير قابلة للصدأ ويجب غسل المضخة جيدا بعد الاستعمال.
- يستعمل محلول الرش بمعدل ٢٠-٦٠ لتر / ١٠٠٠ م^٢ وتملاً نصف المضخة ماء ويضاف المبيد ويحرك جيدا ثم تضاف باقي كمية الماء.
- يرش بواسطة مضخة تقليدية غير قابلة للصدأ وبضغط ضعيف جدا بطريقة المعالجة الموضعية فقط على الأعشاب المراد معالجتها ويجب ملاحظة عدم تطاير المبيد نحو المحاصيل الأخرى القريبة.
- لزيادة فعالية مكافحة يجب رش جراوند-اب في قمة النمو الخضري للأعشاب وقبل فترة الأزهار.
- يجب ري الأرض جيدا قبل الرش وذلك لتأمين الجهازية الكاملة للمبيد داخل الأعشاب المعالجة ويجب عدم ري أو حرث الأرض بعد المعالجة لفترة أسبوع منعا لغسل المبيد عن الأعشاب.

تنبيهات :

- يجب عمل معايرة لمضخة الرش قبل البدء بالمعالجة.
- يجب أن تغطى الأعشاب بالمبيد تغطية كاملة مع ملاحظة أن للظروف الجوية تأثير كبير على نجاح المبيد في مكافحة الأعشاب فعندما يكون الطقس معتدلاً أو دافئاً رطباً يعطى المبيد نتائج جيدة.
- يجب إعادة الرش في حالة سقوط المطر قبل مرور ٦ ساعات على الانتهاء من عمليات الرش.
- إذا كانت المناطق المراد مكافحة أعشابها قد حرثت يجب الانتظار حتى يصبح ارتفاع الأعشاب من ٢٠-٣٠ سم.
- يقاوم المبيد الحشائش الموجودة في قنوات الري وما شابهها برشه عندما تكون القنوات خالية من الماء.
- يفضل عند رش الأعشاب المستديمة أن تكون ذات نمو خضري مناسب على الأقل في طور ٨ ورقات ويعاد الرش بعد ٣٠-٤٥ يوما للأعشاب المستديمة ذات المجموع الجذري العميق.
- يجب تأجيل إزالة الأعشاب المرشوشة لمدة ٣ - ٧ أيام من تاريخ الرش .

فترة تحریم دخول الحقل المرشوش :

يجب عدم دخول الحقل المرشوش قبل مرور ٤ ساعات على آخر معاملة رش.

فترة تحریم الرعي للحيوانات :

يجب عدم رعي أو تغذية الحيوانات إلا بعد مرور ٢١ يوم على آخر معاملة رش.

قابلية الخطأ : يفضل عدم خلطه مع المبيدات الأخرى .

* أسماء تجارية أخرى: جلايتكس - ٤٨ % SL، جلاند - ٤٨ % SL.