

فابكو

المجموعة:

Phosphinic acid

جلوسار - ٢٠٪

مبيد عشبي زراعي سام
مركز قابل للذوبان في الماء



مبيد عشبي غير اختياري يعمل بالملاسة وله تأثير جهازي بسيط ينتقل خلال الأوراق من الأسفل الى الأعلى.

التركيب: كل لتر يحتوي على :

٢٠٪ و/ح (مادة فعالة)

جلوفوسينيت امونيوم

الخواص:

جلوسار-٢٠٪: مبيد عشبي غير اختياري غير قابل للتطاير، لمكافحة العديد من الأعشاب الحولية والمعمرة عريضة ورقية الأوراق.

جلوسار-٢٠٪: تبدأ ظهور نتائج مكافحة الفعالية بعد ٣-٧ أيام لكن نتائج المكافحة الكاملة للأعشاب المعاملة يمكن أن تأخذ فترة ٢٠-٣٠ يوم في الأجواء المعتدلة.

الاستعمالات:

المحصول	الأعشاب المعاملة	الجرعة المستخدمة	ملاحظات
التوت.	النموات غير المرغوب بها عند القاعدة والمصاصات	٥٠٠ مل / ١٠٠ لتر ماء	يجب توجيه الرش لهذه النموات والمصاصات وتجنب رش الأجزاء الخضرية والثمار ويفضل القيام بعملية الرش عندما تكون هذه النموات والمصاصات بطول أقل من ١٥ سم.
الموز، الجوافة، المانجو، البرتقال، الليمون، الجريب فروت، التفاح، الإجاص، السفرجل، اللوز، المشمش، الدراق، الكرن، الخوخ، البندورة، بين الاتلام، الفراولة، العنب.	الاعشاب الحولية والمعمرة.	١-٥ لتر / هكتار كمية الماء المستخدمة: - المرشات الظهرية: يستخدم من ٥٠٠-١٠٠٠ لتر ماء / هكتار وتعتمد كمية الماء على كثافة الأعشاب المعاملة. - المرشات الآلية: يستخدم من ٣٠٠-٥٠٠ لتر ماء / هكتار تحت الظروف الطبيعية.	يجب توجيه الرش على الأعشاب المراد مكافحتها وتجنب تطاير رذاذ المبيد على الأجزاء الخضرية والساق كما يمكن رش المبيد حول الأشجار بعمر سنتين أو أقل.
الأراضي غير المزروعة	الاعشاب الحولية والمعمرة.	١-٦ لتر / هكتار كمية الماء المستخدمة: - المرشات الظهرية: يستخدم من ٥٠٠-١٠٠٠ لتر ماء / هكتار وتعتمد كمية الماء على كثافة الأعشاب المعاملة. - المرشات الآلية: يستخدم من ٣٠٠-٥٠٠ لتر ماء / هكتار تحت الظروف الطبيعية.	---

٢م ١٠٠٠٠ = هكتار

دونم = ٢م ١٠٠٠

• للحصول على معلومات عن الإسعافات الأولية والتحذيرات راجع الفهرس الخاص بذلك في نهاية الكتاب.

فترة الأمان :

التفاح، الإجاص، السفرجل، اللوز، المشمش، الدراق، الكرز، الخوخ: ٢١ يوم.
باقي المحاصيل: لا يوجد لها فترة أمان .

تحذير : عدم استخدام المبيد إلا على المحاصيل المذكورة في جدول الاستعمالات مع الالتزام بفترات الآمان قبل عملية القطف.

ارشادات :

- لا ترش المبيد باستخدام الطائرات (الرش الجوي).
- لا تجعل المبيد يتطاير نحو المحاصيل الأخرى.
- لا ترش إذا كان هناك توقع سقوط الأمطار خلال ٦ ساعات.
- لا ترش الأعشاب تحت ظروف: النمو الضعيف، الجفاف، الرطوبة الزائدة. الجو البارد، في حالات المرض حيث تكون نتائج المكافحة ضعيفة في الأجواء الباردة.
- لا ترش في الجو الحار (أعلى من ٣٣ °م ورطوبة أقل من ٥٠٪).
- يمكن الرش حول الأشجار ذات الأعمار أكبر من سنتين وتعتمد نسبة معدل الرش على نوع الأعشاب المعاملة، مرحلة نمو الأعشاب، كثافة الأعشاب، الظروف الجوية.
- يجب أن تكون التغطية جيدة للأعشاب المكافحة.
- عدم الحصاد قبل مرور ٨ أسابيع من المعاملة.
- يجب عمل معايرة للمضخة قبل عملية المكافحة.
- يجب معاملة الأعشاب في قمة نموها الخضري.
- يجب أن تكون هناك معاملة للأعشاب التي نمت من جديد.

فترة تحريم دخول الحقل المرشوش:

يجب عدم دخول الحقل المرشوش قبل مرور ٢٤ ساعة على آخر معاملة.

فترة تحريم الرعي للحيوانات:

يجب عدم دخول حيوانات الرعي الى المناطق المعاملة قبل مرور فترة ٦٠ يوم على آخر معاملة رش.

قابلية الخلط : قابل للخلط مع معظم المبيدات العشبية ولكن ينصح عمل تجربة خلط مصغرة قبل الرش.