

فايكو

الجموعة :  
Cyanoimidamide

دستروير - ٤٨%



مبيد حشري زراعي سام  
مركز معلق

مبيد حشري جهازي لمكافحة الحشرات الماصة وبعض الحشرات القارضة التي تصيب البندورة، الخيار، الفلفل، البطيخ، الشمام، التفاح، الإجاص، اللوزيات و العنب.

التركيب: كل لتر يحتوي على :

٤٨% و/ح (مادة فعالة)

ثياكلوبريد

الخواص :

دستروير-٤٨%: جيل من المبيدات الحشرية من عائلة النيونيكوتينويد.

دستروير-٤٨%: ثابت في الظروف الجوية المختلفة من أمطار شديدة أو أشعة شمس مما يسمح بامتصاصه من قبل النباتات بكمية كافية.

دستروير-٤٨%: مبيد جهازي يعمل باللامسة وله تأثير معوي سام.

دستروير-٤٨%: للرش الورقي ضد الحشرات القارضة و الماصة التي تصيب البندورة، الخيار، الفلفل، البطيخ، الشمام، التفاح، الإجاص، اللوزيات و العنب.

دستروير-٤٨%: تركيبة ممتازة لمكافحة الحشرات التي اكتسبت مقاومة للمبيدات الحشرية الأخرى.

دستروير-٤٨%: غير سام للنحل والكائنات النافعة لذا يمكن إستعماله وقت الإزهار في برامج المقاومة الحيوية.

الاستعمالات :

المحصول	الآفة	معدل الاستعمال ٢٠ / لتر ماء	فترة الأمان (أيام)
التفاح والإجاص	المن، جعل الأزهار نطاطات الأوراق. ناخرات الأوراق، دودة ثمار التفاح. بق التفاح الأخضر. البق الدقيقي. بسيلا الإجاص.	٥-٤ مل ٦ مل ٥-٤ مل ٥-٤ مل ٢-١,٢٥ مل ٤-٢ مل	١٤
الدراق، المشمش، التكتارين، اللوز	المن.	٤-٢ مل	١٤
البندورة، الخيار، الفلفل، البطيخ، الشمام.	المن، الذبابة البيضاء.	٦-٤ مل	٣
العنب	نطاطات الأوراق.	٣ مل	١٤

تحذير :

يمنع استعمال المبيد على المحاصيل غير الواردة في جدول الاستعمالات مع الالتزام بفتترات الأمان قبل عملية القطف.

فترة تحريم دخول الحقل المرشوش: يجب عدم دخول الحقل المرشوش قبل مرور ٤٨ ساعة على آخر معاملة رش.

قابلية الخلط: يمكن خلطه مع معظم المبيدات المعروفة ما عدا الحامضية والقلوية منها وينصح بعمل تجربة خلط مصغرة مع المبيدات الأخرى قبل الرش.

\* أسماء تجارية أخرى: ديكلوبريد - ٤٨%.

• للحصول على معلومات عن الإسعافات الأولية والتحذيرات راجع الفهرس الخاص بذلك في نهاية الكتاب.