

فايكو

المجموعة:

Oxadiazine

دياكارب-١٥%

مبيد حشري زراعي سام
مركز معلق



مبيد حشري يعمل عن طريق الملازمة والجهاز الهضمي لمكافحة حشرات حرشية الأجنحة على المحاصيل الزراعية الواردة في جدول الاستعمالات.

التركيب: كل لتر يحتوي على:

١٥% و / ح (مادة فعالة)

اندوكساكارب

الخواص:

دياكارب-١٥% : مبيد حشري ينتمي الى عائلة اوكساديازين لمكافحة الحشرات على المحاصيل الزراعية الواردة في جدول الاستعمالات.

دياكارب-١٥% : يتناسب مع برامج مكافحة المتكاملة IPM .

دياكارب-١٥% : يتميز بالتصاقه على سطح النبات المعامل وبالتالي لا ينجس بفعل الامطار.

الاستعمالات:

| المحصول | الآفة | معدل الاستعمال / ٢٠ لتر ماء | فترة الأمان (أيام) |
|---|------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| الصلبنيات (الملفوف، الزهرة، البروكلي واللفت) | فراشة الملفوف الكبرى | ٥ مل | ٣ |
| البندورة، الباذنجان، الفلفل، الخيار، البطيخ والكوسا. | عثة ثمار البندورة، صانعات الأنفاق | ٥ مل | ٣ |
| البطاطا | الديدان القارضة، عثة درنات البطاطا | ٥ مل | ٣ |
| العنب | عثة هريان العنب، نطاطات الأوراق | ٥ مل | ١٤ |
| الدراق، التفاح، الأجاص والمشمش | عثة ثمار التفاح | ٥ مل | ٢٠ |

تحذير:

- عدم استعمال المبيد إلا على المحاصيل الواردة في جدول الاستعمالات مع الالتزام بفترات الأمان قبل عملية القطف.

- يعتبر المبيد متوسط السمية للنحل لذلك يفضل استعماله عندما لا يكون النحل الملحق نشيطاً (أي يستخدم في الصباح الباكر أو في ساعات متأخرة من الليل).

فترة تحريم دخول الحقل المرشوش:

يجب عدم دخول الحقل المرشوش قبل مرور ٤٨ ساعة على آخر معاملة رش.

قابلية الخلط:

قابل للخلط مع معظم المبيدات وينصح بعمل تجربة خلط مصغرة قبل الرش.

* أسماء تجارية أخرى: إندوجرين.

• للحصول على معلومات عن الإسعافات الأولية والتحذيرات راجع الفهرس الخاص بذلك في نهاية الكتاب.