

فابكو

المجموعة:

Pyrethroid

سايبوترين - ٢٥%

مبيد حشري زراعي سام

مركز قابل للاستحلاب



مبيد حشري بايرثرويدي غير جهازى يعمل بالملاسة وعن طريق المعدة لمكافحة العديد من الحشرات على عدد كبير من المحاصيل الزراعية المذكورة في جدول الاستعمالات.

التركيب: كل لتر يحتوي على :

٢٥% و / ح (مادة فعالة)

سايبوترين

الخواص:

سايبوترين - ٢٥% : مبيد حشري بايرثرويدي متوسط السمية للإنسان والحيوان في ظروف استعماله
سايبوترين - ٢٥% : يستعمل على نطاق واسع ويقاوم الديدان القارضة، نطاط الأوراق، الخنفساء البرغوثية، خنفساء الخيار، المن، الذبابة البيضاء، يرقات حرشية الأجنحة، التريس وعثة الظهر الماسي وغيرها والتي تصيب محصول الزهرة، الملفوف، البروكلي، الخس، البصل، الثوم والكراث
سايبوترين - ٢٥% : لا يشكل ضرر على النبات إذا استعمل بالنسب الموصى بها .

الاستعمالات :

المحصول	الآفة	نسبة الاستعمال ٢٠ لتر ماء /	فترة الأمان (أيام)
البروكلي، الزهرة، الملفوف، الخس	الديدان القارضة، نطاط الأوراق، الخنفساء البرغوثية، خنفساء الخيار، المن، الذبابة البيضاء، يرقات حرشية الأجنحة، عثة الظهر الماسي، ديدان البراعم.	١٠-٥ مل	٧
	الديدان، التريس	١٠-٧ مل	
البصل، الثوم، الكراث.	التريس، المن، الديدان، البق.	١٠-٧ مل	٧

تحذير :

- تجنب استعمال المبيد على المحاصيل غير الواردة في جدول الاستعمالات مع الالتزام بفترات الأمان قبل عملية القطف.
- الفترة بين الرش والآخرى يجب أن لا تقل عن ٧ أيام.
- في حالة الإصابة الشديدة يتم استخدام الجرعة الأعلى من المبيد سايبوترين - ٢٥%.
- في حالة الإصابة الخفيفة يتم استخدام الجرعة الأدنى من المبيد سايبوترين - ٢٥%.

فترة تحريم دخول الحقل المرشوش:

يجب عدم دخول الحقل المرشوش قبل مرور ٤٨ ساعة على آخر معاملة رش .

قابلية الخلط :

قابل للخلط مع معظم المبيدات المعروفة، وينصح بعمل تجربة خلط مصغرة قبل الرش.

• للحصول على معلومات عن الإسعافات الأولية والتحذيرات راجع الفهرس الخاص بذلك في نهاية الكتاب.