

فايكو

المجموعه:

Oximinoacetate

سايلكس - ٥٠٪



مبيد فطري زراعي سام

حيبيات قابلة للانتشار في الماء

مبيد فطري يجمع بين خواص المبيدات الجهازية والمبيدات التي تعمل بالملامسة (ميزوسيستيميك) ذو فعالية فائقة كمبيد وقائي ضد الفطريات البيضاء، الأسكية، البازدية والناقصة على المحاصيل الواردة في جدول الاستعمال.

التركيب: كل كغم يحتوي على:

٥٠٪ و/و (مادة فعالة) ٠

تراي فلوكسي ستروبيين

الخواص:

سايلكس-٥٠٪: مبيد فطري يجمع بين خواص المبيدات الجهازية والمبيدات التي تعمل بالملامسة (ميزوسيستيميك) ذو فعالية فائقة كمبيد وقائي ضد الفطريات البيضاء، الأسكية، البازدية والناقصة.

الاستعمالات:

المحصول	المرض	نسبة الاستعمال / ٢٠ لتر ماء	فترة الأمان (أيام)	ملاحظات
المشمش، الكرز، الدراق والخوخ	الجرب، البياض الدقيقي و تبغ الأوراق	٢,٨ - ٥,٧ غم	٣	لا يرش المبيد أكثر من ٤ مرات خلال الموسم ويعاد الرش بعد ٧ - ١٤ يوم من الرشة الأولى.
التفاح، الأجاص، الأسكندنيا والسفرجل	الجرب صدأ التفاح و البياض الدقيقي	٢,٨ غم (رش وقائي) ٣,٥ غم (رش علاجي) ٢,٨ - ٣,٥ غم	١٤	• لا يرش المبيد أكثر من ٤ مرات خلال الموسم ويعاد الرش للجرب و صدأ التفاح بعد ٧ - ١٠ أيام، وللبياض الدقيقي بعد ١٠ - ١٤ يوم. • عند رش المبيد أكثر من مرتين متتاليين ينصح باستخدام مبيد فطري آخر من مجموعة مختلفة ثم يعاد الرش من المبيد سايلكس ٥٠٪.
الحمضيات (ليمون، برتقال، مندلينا و بوملي)	اللفحات الجرب	٢,٨ - ٥,٧ غم	٧	لا يرش المبيد أكثر من ٤ مرات خلال الموسم.
العنب	البياض الدقيقي عفن البوترائيس والتبغعات العفن الأسود البياض الزغبي	٢,٨ - ٢,١ غم ٤,٢٥ غم ٢,٨ غم ٥,٧ غم	١٤	• لا يرش المبيد أكثر من ٤ مرات خلال الموسم ويعاد الرش للبياض الدقيقي، عفن البوترائيس والتبغعات بعد ١٤ - ٢١ يوم، للعفن الأسود بعد ١٠ - ١٤ يوم وللبياض الزغبي بعد ٧ - ١٠ أيام. • في حالات الإصابة الشديدة تستخدم نسبة الاستعمال الأعلى وفترة إعادة الرش الأدنى. • لا يستخدم على CONCORD GRAPES.

• للحصول على معلومات عن الإسعافات الأولية والتحذيرات راجع الفهرس الخاص بذلك في نهاية الكتاب.

فايكو

المحصول	المرض	نسبة الاستعمال ٢٠ / لتر ماء	فترة الأمان (أيام)	ملاحظات
القرعيات (الخيار، الكوسا، القرع، البطيخ والشمام)	البياض الدقيقي البياض الزغبي	٢,٠ - ٢,٨ غم ٥,٧ غم	٣	لا يرش المبيد أكثر من ٤ مرات خلال الموسم.
البندورة، البادنجان والفلفل	اللفحة المبكرة تبقع الأوراق الرمادي واللفحة المتأخرة الأنثراكوز والتبقع السببوري البياض الدقيقي (على الفلفل)	٢,٨ - ٤,٢٥ غم ٥,٧ غم ٤,٢٥ - ٥,٧ غم ٢,١ - ٢,٨ غم	٣	لا يرش المبيد أكثر من ٤ مرات خلال الموسم.
البطاطا	اللفحة المبكرة	٤,٢٥ - ٥,٧ غم	٧	لا يرش المبيد أكثر من ٦ مرات خلال الموسم.
الكرفس	اللفحات والصدأ	٢,٨ - ٤,٢٥ غم	٧	لا يرش المبيد أكثر من ٤ مرات خلال الموسم ويعاد الرش بعد ١٤ يوم من الرشة الاولى.
اللفت، الجزر، الهندباء البرية، البقدونس والشمندر	اللفحات، التبقعات، البياض الدقيقي والصدأ	٢,٨ - ٤,٢٥ غم	٧	لا يرش المبيد أكثر من ٤ مرات خلال الموسم ويعاد الرش بعد ١٤ يوم من الرشة الاولى. • في حالات الاصابة الشديدة تستخدم نسبة الاستعمال الأعلى وفترة اعادة الرش الأدنى.

تحذير:

- تجنب استعمال المبيد على المحاصيل غير الواردة في جدول الاستعمالات مع الالتزام بفترات الأمان قبل عملية القطف.
- يمنع استعمال المبيد على بعض أصناف العنب مثل CONCORD GRAPE لأنه يسبب حساسية لهذا الصنف.
- يسمح بإعادة زراعة المحاصيل المذكورة في جدول الاستعمالات للمناطق المعاملة بالمبيد سايلكس - ٥٠% فوراً بعد الحصاد.
- وللمحاصيل الغير مذكوره في جدول الاستعمالات يتم زراعة الارض المعاملة بالمبيد سايلكس - ٥٠% بعد ٣٠ يوم من آخر معاملة رش.
- يمنع استخدام المبيد في البيوت البلاستيكية وفي أنظمة الري.

فترة تحريم دخول الحقل المرشوش: يجب عدم دخول الحقل المرشوش قبل مرور ٤٨ ساعة على آخر معاملة رش.

قابلية الخلط: قابل للخلط مع معظم المبيدات الحشرية والفطرية والأسمدة الورقية وينصح بعمل تجربة خلط مصغرة قبل الرش.