



فابيكو

المجموعة:
Cyanoacetamide oxime^(١)
Oxazo lidinedione^(٢)

سيمودون - ٥٢,٥%

مبيد فطري زراعي سام
حبوبات قابلة للانتشار في الماء

مبيد فطري جهازي يعمل باللامسة يستعمل لمكافحة الأمراض الفطرية بكفاءة عالية على المحاصيل الواردة في جدول الاستعمالات.

التركيب: كل كجم يحتوي على :

(٣٠٪) و / و (مادة فعالة)

(٥٪) و / و (مادة فعالة)

سايموكسانيل^(١)

فاموكسادون^(٢)

الغواص :

سيمودون - ٥٪ : يتكون من مادتين فعاليتين أحدهما السايموكسانيل ذو خاصية النفاذية لمكافحة البياض الزيغي واللحفات حيث يخترق سطح الورقة بسرعة ليتوزع داخلها بشكل متكافئ وفعالية عالية كما يتكون أيضاً من مادة فاموكساندون حيث تعمل على منع التنس الميتوكدينوني ولها قابلية على منع نشاط السبّورات السابقة والميسيلوم لفترة زمنية طويلة.

سيمودون - ٥٪ : مبيد وقائي وعالجي فعال لمكافحة الأمراض الفطرية الواردة في جدول الاستعمال.

الاستعمالات :

موعد الرش	عدد مرات الرش	فتره الأمان (أيام)	معدل الاستعمال / ٢٠ لتر ماء	المرض	المحصول
قبل التفتح حتى الحصاد.	٤	١٤	٨ غم	اللحفة المبكرة، اللحفة المتأخرة	البطاطا.
		٣		البياض الزيغي، الأنثرباريا	البنادورة.
					الخس.
					الخيار، الكوسا، البطيخ، الشمام، القرع.

تحذير :

يمنع استعمال المبيد على المحاصيل غير الواردة في جدول الاستعمالات مع الالتزام بفترات الأمان قبل القطف.

فتره تحرير دخول الحقل المرشوش :

يجب عدم دخول الحقل المرشوش قبل مرور ٢٤ ساعة على آخر معاملة رش.

قابلية الخلط :

غير قابل للخلط مع المواد القلوية وينصح بعمل تجربة خلط مصغره قبل الرش.

* للحصول على معلومات عن الإسعافات الأولية والتحذيرات راجع الفهرس الخاص بذلك في نهاية الكتاب.