



**فابكتو**

المجموعة:  
Avermectin (١)  
Tetronic Acid (٢)

# سبايدرفاپ - ٤٪

مبيد حلم وحشرى زراعي سام  
مركز معلم

مبيد حلم وحشرى يعمل عن طريق الملامسة فعال لكافحة الآفات المذكورة في جداول الاستعمالات.

التركيب : كل لتر يحتوى على :

٤٪ (١٪ Avermectin + ٢٪ Tetronic Acid)

٨٪ (٢٪ سبيروميسيفين + ٦٪ أبامكتين)

٨٪ (٢٪ سبيروميسيفين + ٦٪ أبامكتين)

الخواص :

**سبايدرفاپ - ٤٪** : مبيد حلم وحشرى يعمل بشكل أساسى عن طريق الملامسة والتغذية، يحتوى على مادتين فعاليتين أحدهما سبيروميسيفين والذى ينتمى إلى مجموعة حمض التترونيك ومادة الأبامكتين. تعمل التركيبة كمبطط التخليق الحيوى للدهنيات ويتأخر مع عملية تكون الدهنيات للذباب البيضاء والحلم عن طريق منع تكوين الأحماض الدهنية.

**سبايدرفاپ - ٤٪** : طور الحوريات من الذباب البيضاء والحلم ستفشل في الوصول إلى الطور البالغ.

الاستعمالات :

المحصول	الأفة	معدل الاستعمال / لترماء	تعليمات الاستعمال	فتررة الأمان (أيام)
القطن	الحلم القرمزى، حلم الصراز، حلم الفراولة، الحلم الأحمر ذو النقطتين، الذباب البيضاء.	٢٠ مل / موسم	- عند بداية الموسم: يطبق البند عندما يقل طول القطن عن ٥ سم في منتصف وأخر الموسم. - لا يسمح بربع الماشية في حقل القطن العالج. - الحد الأقصى من الاستعمال المسموح به في السنة: ٤٧ مل / ٢٠ لتر. - الحد الأقصى لعدد تطبيقات المبيد في السنة: ٣	٣٠
الخيار، الشمام، القرع، البطيخ، الكوسا	الحلم الأحمر ذو النقطتين، الذباب البيضاء.	١٣ - ١٠ مل	- الحد الأقصى من الاستعمال المسموح به لكل موسم: ٣٨ مل / ٢٠ لتر. - لا يجب تطبيق أكثر من رشتين متتاليتين للنبيذ سبايدرفاپ - ٤٪. أو أي تطبيق ورقى لأى منتج يتكون من سبيروميسيفين أو أبامكتين. - الحد الأقصى لعدد تطبيقات المبيد في السنة: ٣	٧
الباذنجان، الفلفل، الفليفلة، البندوره	الحلم العريض، البصل، الحلم الأحمر ذو النقطتين، حلم صبا البندوره، الذباب البيضاء	١٣ - ١٠ مل	- الحد الأقصى من الاستعمال المسموح به لكل موسم: ٣٨ مل / ٢٠ لتر. - لا يجب تطبيق أكثر من رشتين متتاليتين للنبيذ سبايدرفاپ - ٤٪. أو أي تطبيق ورقى لأى منتج يتكون من سبيروميسيفين أو أبامكتين. - لا تستخدمه على الخضروات المزروعة للتشتيل.	٧
الجرجير، الرشاد، الهندباء، الخس، البقدونس، السبانخ	الحلم القرمزى، الحلم الأحمر ذو النقطتين، الذباب البيضاء	١٣ - ١٠ مل	- الحد الأقصى من الاستعمال المسموح به لكل موسم: ٣٨ مل / ٢٠ لتر. - لا يجب تطبيق أكثر من رشتين متتاليتين للنبيذ سبايدرفاپ - ٤٪. أو أي تطبيق ورقى لأى منتج يتكون من سبيروميسيفين أو أبامكتين. - لا تستخدمه على الخضروات المزروعة للتشتيل.	٧

\* للحصول على معلومات عن الإسعافات الأولية والتحذيرات راجع الفهرس الخاص بذلك في نهاية الكتاب.

# فابكو

المحصول	الاضحة	معدل الاستعمال ٢٠ / لتر ماء	تعليمات الاستعمال	فترات الأمان (أيام)
الفراولة	الحلم العريض، الحلم القرمزى، الحلم الأحمر ذو القطتين، حلم الفراولة، الدبابة البيضاء	١٨ - ٢٤ مل	- الحد الأقصى من الاستعمال المسموح به لكل موسم: ٧١ مل / ٢٠ لتر. - لا تستخدم في مشاتل الفراولة. - انتظر ٢١ يوماً على الأقل بعد التطبيق الثاني قبل تكرار التطبيق.	٣
الخرشوف، الزنجبيل، البطاطا، الحلوة، الكركم	البسيلاء، الحلم الأحمر ذو القطتين، الدبابة البيضاء	١٢ - ٢٤ مل	- لا يجب تطبيق أكثر من رشتين متتابعين للمبيد سبايدر قاب - ٢٤٪. أو أي تطبيق ورقي لأي منتج يتكون من سبيروميسفين أو أبامكتين. - الحد الأقصى من الاستعمال المسموح به في السنة: ٤٧ مل / ٢٠ لتر.	١٤

## تحذير:

- لا يستعمل المبيد إلا على المحاصيل الواردة في جدول الاستعمالات مع مراعاة فترات الأمان قبل عملية القطف.
- لا يستخدم في الهياكل المغلقة، مثل البيوت البلاستيكية.
- لا يستخدم من خلال أي نظام من أنظمة الري.
- يجب أن يتم خلطه في الخزان باستخدام / مساعد ADJUVANT يحتوي على خصائص احتراق تزيادة امتصاص الأوراق، لا تخلط هذا المبيد مع أي مواد تحتوي على خصائص لاصقة.

## تطبيقات الرش الورقي:

يجب أن يتم تغطية النبات بشكل شامل.

## التطبيقات الأرضية:

يجب أن يكون محلول السقاية لا يقل عن ٣٨ لترًا من الماء / ٤٠٠ مل من الماء.

## توقيت الري:

السماح بمدة لا تقل عن ٢٤ ساعة بين استخدام المبيد وأي نوع من أنواع الري.

## فترقة تعريض دخول الحقل المرشوش:

يجب عدم دخول الحقل المرشوش قبل مرور ٤٨ ساعة على آخر معاملة رش.

## قابلية الخلط :

قابل للخلط مع معظم المبيدات، ولكن ينصح بعمل تجربة خلط مصغرة قبل ٢٤ ساعة من الرش أو خلط المبيد.

تراكيب وأسماء تجارية أخرى : فابيكومك سبيدي - ٢٠٪ .

للحصول على معلومات عن الإسعافات الأولية والتحذيرات راجع الفهرس الخاص بذلك في نهاية الكتاب.