

فابكو

الجموعة :
Sulfonylurea

سلفون - ٧٥%

مبيد عشبي زراعي سام
حببيات قابلة للانتشار بالماء



مبيد عشبي جهاز اختياري يستعمل لمكافحة الأعشاب عريضة ورفيعة الأوراق في حقول القمح.

التركيب : كل كغم يحتوى على :

سلفوسلفورون

الخواص :

سلفون-٧٥%: مبيد عشبي جهاز اختياري يستعمل لمكافحة الأعشاب عريضة ورفيعة الأوراق في حقول القمح.

سلفون-٧٥%: يمتاز بفعاليتته العالية وبكميات المتبقيات البسيطة على النباتات.

سلفون-٧٥%: يعمل على إيقاف نمو الأعشاب التي تنافس المحصول حيث تظهر أعراض المكافحة بعد اسبوع الى ثلاث اسابيع من الرش.

الاستعمالات :

المحصول	الأعشاب	معدل الاستعمال	ملاحظات	فترة الأمان (أيام)
القمح الشتوي	الأعشاب العريضة والرفيعة الأوراق.	٤٧,٢٥ غم/هكتار	يستعمل قبل وبعد الانبات على أن لا يستعمل قبل الانبات في الأراضي غير المحروثة أو التي تحتوي على متبقيات عالية من النبات .	٣٠ للقش ٥٥ للحبوب
القمح الربيعي			- لا يستعمل قبل الانبات . - يستعمل بعد الانبات لغاية مرحلة العقدة الثانية ولا يستعمل على القمح القاسي وإذا استعمل يؤدي الى بطء في النمو سرعان ما يزول هذا بطء الذي لا يؤثر على المردود.	

هكتار = ١٠٠٠ م^٢

تحذير : يمنع استعمال المبيد على المحاصيل غير الواردة في جدول الاستعمالات مع الالتزام بفترات الأمان قبل عملية القطف.

ارشادات :

- يجب معايرة آلة الرش قبل الاستعمال.
- لمكافحة فعالة يتم الرش عندما تكون الأعشاب في أعمارها الأولى.
- يجب تغطية الأعشاب تغطية كاملة.
- يجب اخذ كافة الاحتياطات للحيلولة دون حصول تطاير المبيد للمحاصيل المجاورة أو مصادر المياه.
- مستوى المكافحة بهذا المبيد تعتمد على معدل الاستعمال، نوع الأعشاب وحجمها ووقت المعاملة وعلى ظروف النمو.
- للحصول على افضل نتائج للمكافحة وبالمعاملة بعد الانبات يجب ان تكون الأعشاب ذات نمو نشيط وفي حالة الأعشاب الكثيفة يفضل المعاملة باكرا وقبل حصول منافسة قوية من قبل الأعشاب للمحصول المعامل.
- هذا المبيد لا يستخدم خلال أي من أنظمة الري.

فترة تعريم الرعي للحيوانات : يمنع رعي او تغذية الحيوانات في الحقل المرشوش لمدة لا تقل عن ١٤ يوما على آخر معاملة رش.

فترة تعريم دخول الحقل المرشوش : يجب عدم دخول الحقل المرشوش قبل مرور ١٢ ساعة على آخر معاملة رش.

قابلية الخلط :

- يفضل عمل تجربة خلط مصغرة قبل الرش.
- غير قابل للخلط مع الاسمدة السائلة ذات درجة الحموضة ≥ ٥ او مع المواد الحاملة غير الايونية والمضافات التي تجعل من درجة حموضة محلول الرش ≥ ٥ .
- غير قابل للخلط مع المركبات الفسفورية العضوية ومركبات الملاثيون.

• للحصول على معلومات عن الاسعافات الاولية والتحذيرات راجع الفهرس الخاص بذلك في نهاية الكتاب.