

فابكو

المجموعة :
Organophosphate

ستينيون - ULV٪٥٠



مبيد حشري سام
لمكافحة الجراد الصحراوي
رذاذ متناهي الصغر

مبيد حشري فسفوري عضوي ذو مجال واسع لمكافحة الجراد الصحراوي (الحوريات والأطوار البالغة أو الحشرات الكاملة).

التركيب : كل لتر يحتوي على :

٥٠٪ (مادة فعالة)

فنتروشينون

الخواص :

ستينيون ٪٥٠ ULV : مركب فسفوري عضوي ذو فعالية قوية يعمل عن طريق الملامسة والجهاز الهضمي.

ستينيون ٪٥٠ ULV : متوسط السمية للإنسان والحيوان.

ستينيون ٪٥٠ ULV : له قدرة على اختراق أنسجة النبات.

ستينيون ٪٥٠ ULV : لا يحتاج إلى مزجه بملاء وتحتمد كمية الرش على المحصول وعلى حجم الإصابة.

ستينيون ٪٥٠ ULV : مبيد حشري فعال في مكافحة الجراد الصحراوي (الحوريات والأطوار البالغة أو الحشرات الكاملة) عن طريق عمل الحاجز أو التقطيعية الكاملة.

الاستعمالات :

الفترة الآمنة (أيام)	معدل الاستعمال	الآفة	المحصول
١٤	٩٠ مل / دونم عن طريق عمل الحاجز أو التقطيعية ال الكاملة	الجراد الصحراوي (الحوريات والأطوار البالغة أو الحشرات الكاملة).	جميع المحاصيل

دونم = ٢٠٠٠ م²

تحذير : يجب الالتزام بفترات الأمان قبل عملية القطف .

السمية على النبات : غير سام للنباتات في ظروف استعماله الطبيعية ولكن قد يسبب بعض الأضرار للقطن والعائلة الصليبية (الملفوف، الزهرة، اللفت، الفجل) وبعض أشجار الفاكهة عند رشه بجرعات عالية، قد يسبب احمرار وصدأ بعض أصناف التفاح.

فترة تحريم دخول المنطقة المعاملة : يجب عدم دخول المنطقة المعاملة قبل مرور ٤٨ ساعة على آخر معاملة .

ملاحظات :

- عدم استهلاك أو أكل الجراد الذي يتم رشه.
- عدم قطف المحصول قبل مرور فترة الأمان الموصى بها على العبوة.
- وضع إشارة تحذيرية تفيد بأن المحصول مرشوش بمبيدات لمكافحة الجراد والجنادب.
- عدم رعي الأغنام على المحصول المرشوش في حال تلف المحصول.

* للحصول على معلومات عن الإسعافات الأولية والتحذيرات راجع الفهرس الخاص بذلك في نهاية الكتاب.