

فايكو

المجموعة:  
Beta-ketonitrile

فاب - ربابا ٢٠٪

مبيد حلم زراعي سام  
مركز معلق



مبيد حلم غير جهازي يعمل بالملامسة كما ويؤثر على كافة أطوار الحلم من عائلة Tetranychidae.

التركيب : كل لتر يحتوي على :

٢٠٪ و / ح (مادة فعالة)

سيفلوميتوفين

الخواص :

فاب-ربابا ٢٠٪ : يعمل عن طريق التأثير الصاعق والتأثير النشط المتبقي على جميع أطوار الحلم (بيوض -

حوريات - الاطوار المتحركة) من عائلة Tetranychidae

فاب-ربابا ٢٠٪ : يدخل ضمن برامج مكافحة المتكاملة للأفات (IPM) لأنه مبيد آمن على الحشرات النافعة.

الاستعمالات :

المحصول	الآفة	معدل الاستعمال ٢٠ لتر ماء /	موعد التطبيق	عدد مرات الرش في الموسم الواحد	الحد الأقصى للاستعمال / الموسم	الفترة ما بين الرش والأخرى	الحد الأقصى من الواسم لكل محصول / سنة	فترة الأمان (أيام)
التفاح، الأجاص، السفرجل، الأسكندنيا.	الحلم الاحمر الاوروبي	٢٠ مل	يجب التطبيق عند ظهور	٢	٤٠,٥ مل / ٢٠ لتر	١٤ يوم يجب عدم القيام	١	٧
العنب. الفراولة.	الحلم ذو النقطتين،		أول علامة على		الموسم الواحد /	باكثر من تطبيق		١٤
الدراق، الكرز، النكتارين، المشمش، الخوخ.	حلم الحمضيات		الإصابة وقبل		المحصول الواحد	واحد قبل استخدام		٣
اللوز، الجوز، الفسق الحلبي البرتقال، البوملي، الليمون، الجريب فروت، المندرين، الكمكوات البندورة	الحلم القرمزي		زيادة عدد الحلم.			مبيد حلم فعال آخر مع طريقة عمل مختلفة.		٧
								٧
								٣

تحذير :

- لا يستعمل المبيد إلا على المحاصيل الواردة في جدول الاستعمالات مع مراعاة فترات الأمان قبل عملية القطف.
- للتقليل من احتمال ظهور المقاومة يوصى بتناوب المبيد فاب ربابا - ٢٠٪ مع المبيدات الأخرى.
- لا يستخدم في البيوت البلاستيكية ولا في أنظمة الري.

فترة تجريم دخول الحقل المرشوش : يجب عدم دخول الحقل المرشوش قبل مرور ٢٤ ساعة على آخر معاملة رش.

قابلية الخلط : قابل للخلط مع معظم المبيدات المعروفة ما عدا القلووية منها، إلا أنه ينصح بإجراء تجربة خلط مصغرة قبل الرش بـ ٢٤ ساعة.

• للحصول على معلومات عن الإسعافات الأولية والتحذيرات راجع الفهرس الخاص بذلك في نهاية الكتاب.