



فابكوزين

المجموعة :
Formamidine

فابكوزين -٪٢٠

مبيد حلم وحشرى زراعي سام
مركز قابل للإستحلاب

مبيد حلم وحشرى غير جهازى يقضى على كافة أطوار الحلم ويقاوم عدد كبير من الحشرات التي تصيب المحاصيل الواردة في جدول الاستعمالات.

التركيب: كل لتر يحتوى على :

أميتراز ٪٢٠ وج (مادة فعالة)

الغواص:

فابكوزين -٪٢٠ : مبيد حلم وحشرى ذو مجال واسع على الحشرات عديدة العوائل وذو سمية منخفضة للثدييات.

فابكوزين -٪٢٠ : يقضى على الحلم بجميع أطواره (بيض، حوريات، أطوار كاملة) التي اكتسبت مناعة ضد المبيدات الأخرى مما يقلل عمليات الرش الازمة للمقاومة.

الاستعمالات:

فتررة الأمان (أيام)	موعد الرش	معدل الاستعمال / لترماء	الاffecte	المحصول
٢١	عند فقس ٪٨٠-٦٠ من البيض الشتوي او عند تواجد ما معدله ٢ آفة / ورقة	٤٠-٢٠ مل	الحلم الأحمر	الخوخ
٢١	عند فقس ٪٨٠-٦٠ من البيض الشتوي او عند تواجد ما معدله ٢ آفة / ورقة. عند ظهور الإصابة.	٤٠-٢٠ مل ٥٠-٤٠ مل	الحلم الأحمر, بسيلالا جاص	التناخ, الاجاص
١٤	عند وجود ما يعادل ٢ آفة / ورقة	٥٠-١٠ مل ٥٠-٦ مل ٥٠-١٠ مل	الحلم الأحمر ذو النقطتين, حلم الحمضيات الأحمر, حلم صدأ الحمضيات	الحمضيات (الليمون، البرتقال الجريب فروت، البوملي، المندلينا)
٧	يبدأ الرش بمجرد ظهور الإصابة بالحلم وتكرر العملية كل أسبوعين او ثلاثة أسابيع حسب الحاجة	٥٠ مل	حلم الصدأ	الباذنجان و التلفل

تحذير:

يمنع استعمال المبيد على المحاصيل غير الواردة في جدول الاستعمالات مع الالتزام بفترات الأمان قبل عملية القطف.

فتررة تحريم دخول الحقل المرشوش :

يجب عدم دخول الحقل المرشوش قبل مرور ٢٤ ساعة على آخر معاملة رش.

قابلية الخلط :

غير قابل للخلط مع المبيدات القلوية والباراثيون والمبيدات الأخرى .

* للحصول على معلومات عن الإسعافات الأولية والتحذيرات راجع الفهرس الخاص بذلك في نهاية الكتاب.