

فايكو

المجموعة:  
Avermectin (1)  
Carbazate (2)

فايكومك - برو ٤, ٥٠%

مبيد حلم وحشري زراعي سام  
مركز معلق



مبيد حلم و حشري غير جهازى يعمل عن طريق الملامسة وله تأثير طويل الامد.

التركيب : كل لتر يحتوي على :

٢,٤ ٪ و / ح (مادة فعالة)

ايبامكتين (1)

٤٨,٠ ٪ و / ح (مادة فعالة)

بيفيثنازيت (2)

الخواص :

فايكومك - برو ٤, ٥٠% : مبيد ذو تركيبة فريدة من المادتين الفعاليتين (ايبامكتين وبيفيثنازيت) وله تأثير باللامسة.  
فايكومك - برو ٤, ٥٠% : خليط من مادتين فعاليتين ذو طريقة عمل مختلفتان مما يجعله ذو تأثير على جميع أطوار الحلم والحشرات.

فايكومك - برو ٤, ٥٠% : يستخدم لمكافحة الحلم ذو النقطتين، حلم البراعم، الحلم الأوروبي الأحمر، حلم الصدا وصناعات الأنفاق.

الاستعمالات :

المحصول	الآفة	معدل الاستعمال ٢٠ / لتر ماء	موعد الاستعمال	فترة الأمان (أيام)
نباتات الزينة	الحلم ذو النقطتين، حلم البراعم، الحلم الأوروبي الأحمر، حلم الصدا. صناعات الأنفاق.	٥-٦ مل ٩ مل	- يرش المبيد عند ظهور الإصابة	---
أشجار الفاكهة قبل مرحلة العقد	الحلم ذو النقطتين، حلم البراعم، الحلم الأوروبي الأحمر، حلم الصدا. صناعات الأنفاق.	٥-٦ مل ٩ مل	- في حال الإصابة الشديدة يتم تكرار الرش بعد ٧ أيام من الرشة الأولى	---
المشاتل، الأشجار الحرجية، الأشجار الصنوبرية، أشجار المناظر الطبيعية	الحلم ذو النقطتين، حلم البراعم، الحلم الأوروبي الأحمر، حلم الصدا . صناعات الأنفاق.	٥-٦ مل ٩ مل	- يستخدم فقط مرتين بالموسم	---

تحذير :

- لا يستعمل المبيد إلا على المحاصيل الواردة في جدول الاستعمالات مع مراعاة فترات الامان قبل عملية القطف.
- قد يسبب حروق للتفاحيات عند خلطه مع مركب الكابتان.
- لا يستخدم في مشاتل الحمضيات.
- لا يطبق عن طريق المرشات الجوية، ولا عن طريق أنظمة الري.

فترة تعريم دخول الحقل المرشوش : يجب عدم دخول الحقل المرشوش قبل مرور ٢٤ ساعة على اخر معاملة رش.

قابلية الخلط :

قابل للخلط مع معظم المبيدات باستثناء مركبات الكابتان وينصح بعمل تجربة خلط مصغرة قبل الرش.

• للحصول على معلومات عن الإسعافات الأولية والتحذيرات راجع الفهرس الخاص بذلك في نهاية الكتاب.