

فايكو

المجموعة:
Avermectin⁽¹⁾
Nitroguanidine⁽²⁾

فايكومك فلكس

مبيد حلم وحشري زراعي سام
مركز معلق



مبيد حلم وحشري يتميز باحتواءه على مادتي ثياميثوكسام وأيامكتين ذو تأثير جهازي، باللامسة ومعدي لمكافحة الحلم والحشرات الثاقبة والماصة على المحاصيل الواردة في جدول الاستعمالات.

التركيب : كل لتر يحتوي على :

٣,٣% و / ح (مادة فعالة)

أيامكتين^(١)

١٥,٢% و / ح (مادة فعالة)

ثياميثوكسام^(٢)

الخواص :

فايكومك فلكس : مبيد حلم وحشري ذو تأثير جهازي، معدي وباللامسة.

فايكومك فلكس : يحتوي على ثياميثوكسام وأيامكتين لمكافحة الحلم والحشرات الثاقبة والماصة.

الاستعمالات :

المحصول	الأفة	معدل الاستعمال / ٢٠ لتر ماء	تعليمات الاستعمال	فترة الأمان (أيام)
الحمضيات (الليمون، البرتقال، الماندرينا، البوملي، الكمكوات، الجريب فروت)	المن، الحشرات القشرية، الحلم العريض، ذبابة الحمضيات السوداء، صانعات الأنفاق، حلم صدأ الحمضيات، التريس، ذبابة ثمار الفاكهة، نطاطات الاوراق، البق الدقيقي، الحلم ذو النقطتين، الذبابة البيضاء	٨ - ١٢ مل	- لا يستخدم على الأشتال. - لا يستخدم قبل وخلال مرحلة الازهار وخصوصا عند تواجد النحل. - يكرر رش فايكومك فلكس او اي من المبيدات التي تحتوي على أيامكتين بعد ٣٠ يوم على الأقل. (يكرر الرش ٣ مرات خلال السنة كحد أقصى) - يعاد رش اي من المبيدات التي تحتوي على ثياميثوكسام بعد ٧ ايام على الأقل.	٧
الخرشوف، الزنجيل، البطاطا، البطاطا الحلوة	الخنفساء البرغوشية/ (الطور البالغ)، صانعات الأنفاق، نطاطات الاوراق، الحلم	٧ مل	- يبدأ الرش عند ظهور الأفة - يكرر الرش بعد ٧ ايام على الأقل . (يكرر الرش مرتان كحد أقصى)	١٤

• للحصول على معلومات عن الاسعافات الأولية والتحذيرات راجع الفهرس الخاص بذلك في نهاية الكتاب.

فابكو

تحذير :

- لا يستعمل المبيد إلا على المحاصيل الواردة في جدول الاستعمالات مع مراعاة فترات الأمان قبل عملية القطف.
- يمنع الرش خلال مرحلة ما قبل الإزهار أو عند الإزهار في الحمضيات وخاصة عند تواجد النحل.
- توضع المناحل في الحقول بعد ٥ أيام على الأقل من آخر معاملة رش.
- يجب رش فابكومك فلكس بعد غروب الشمس وعندما تكون درجات الحرارة أقل من ١٢ مئوي.
- في محاصيل: البطاطا، البطاطا الحلوة، الخرشوف و الزنجبيل يكرر الرش بعد ٧ أيام على الأقل (مرتان كحد أقصى خلال الموسم).
- في الحمضيات يكرر رش فابكومك فلكس أو أي من المبيدات التي تحتوي على أبامكتين بعد ٣٠ يوم على الأقل (يكرر الرش ٣ مرات خلال السنة كحد أقصى) أما المبيدات التي تحتوي على ثياميثوكسام يكرر الرش بعد ٧ أيام على الأقل.
- يمنع استخدام فابكومك فلكس في أنظمة الري.

فترة تحريم دخول الحقل المرشوش :

يجب عدم دخول الحقل المرشوش قبل مرور ٤ أيام على آخر معاملة رش.

فترة تحريم الرعي للحيوانات :

يمنع رعي الحيوانات في المناطق المعاملة منعاً باتاً.

قابلية الخلط :

قابل للخلط مع معظم المبيدات ما عدا الكابتان، ينصح بعمل تجربة خلط مصغرة قبل ٢٤ ساعة من الرش .