

فابكو

المجموعة:  
diacylhydrazine

# فابوزايد- ٢٤%

مبيد حشري زراعي سام  
مركز معلق



مبيد حشري له طريقة عمل جديدة تحاكي عمل هرمون الإنسلاخ على يرقات حشرات حرشفية الأجنحة، و هو فعال ضد جميع أطوار اليرقات ومع ذلك، يفضل استخدامه على الأطوار الأولى لتقليل من أضرار تغذية اليرقات على النبات.

التركيب : كل لتر يحتوي على :

٢٤% و/ح (مادة فعالة)

ميثوكسيفينوزايد

الخواص :

فابوزايد- ٢٤% : ينتمي المبيد الحشري فابوزايد- ٢٤% إلى مجموعة دياسيل هيدرازين ذو طريقة عمل جديدة تحاكي عمل هرمون الإنسلاخ ليرقات حرشفية الأجنحة (العثث والقرشات).

فابوزايد- ٢٤% : يجعل اليرقات تتوقف عن التغذية في غضون ساعات من ابتلاعها للمنتج لكن الموت الكامل لليرقات قد يستغرق عدة أيام.

فابوزايد- ٢٤% : يستخدم فقط لمكافحة حشرات حرشفية الأجنحة مما يجعله مثاليا لإستخدامه لبرامج لمكافحة المتكاملة IPM.

الاستعمالات :

المحصول	الآفة	معدل الاستعمال ٢٠/ لتر ماء	وقت الاستعمال	الفترة المسموح بها لإعادة استخدام المبيد (أيام)	فترة الأمان (أيام)
البروكلي، الملفوف، الزهرة	الديدان (عدا الديدان القارضة فقط يُنْبِط عملها)	٦-١٢ مل	- في بداية الموسم ويتم معاملة النموات الجديدة والنباتات الصغيرة وذلك عند ظهور آثار تغذية الديدان على النبات.	----- لا تستخدم أكثر من ١,٨٩٣ لتر من المنتج / ٤٠٠ لتر ماء / سنة	٣
		١٢-١٥ مل	- خلال الموسم أو في نهاية الموسم.	----- لا تستخدم أكثر من ١,٨٩٣ لتر من المنتج / ٤٠٠ لتر ماء / سنة	
		-----	- في حال الإصابة الشديدة.	١٠-١٤ يوم لا تستخدم أكثر من ١,٨٩٣ لتر من المنتج / ٤٠٠ لتر ماء / سنة	
عثة الظهر الماسي	-----	١٨-٢٤ مل	- يفضل استخدام المبيد في الفترة التي يتم فيها وضع البيوض .	----- لا تستخدم أكثر من ١,٨٩٣ لتر من المنتج / ٤٠٠ لتر ماء / سنة	-----
الحمضيات: (الليمون، الجزريب الضروت، البوملي، الكمكوات المتدرين، البرتقال)	صانعات الأنفاق لثافات الأوراق الديدان القارضة	١٢-٢٤ مل	- يتم استخدام المبيد عند بداية ظهور الآفة على النموات الجديدة.	-لا تستخدم أكثر من ١,٨٩٣ لتر من المنتج / ٤٠٠ لتر ماء / سنة. -لا تستخدم المبيد أكثر من ٤ مرات خلال السنة	١٤

• للحصول على معلومات عن الإسعافات الأولية والتحديدات راجع الفهرس الخاص بذلك في نهاية الكتاب.

## فابكو

المحصول	الآفة	نسبة الاستعمال / ٢٠ لتر ماء	وقت الاستعمال	الفترة المسموح بها لإعادة استخدام المبيد (أيام)	فترة الأمان (أيام)
الذرة، الذرة البحلوة	الحضار الديدان	٢٤-٦ مل	- في الفترة التي يتم فيها فقس البيوض.	٥ - لا تستخدم أكثر من ١,٨٩٣ لتر من المنتج / ٤٠٠ لتر ماء / سنة - لا تستخدم المبيد أكثر من ٤ مرات خلال السنة	٢١
القطن	الديدان	١٥-٦ مل	- الفترة التي يتم فيها فقس البيوض أو عندما يلاحظ آثار تغذية الديدان على النباتات (استخدم الجرعة الأعلى في حال الإصابة الشديدة).	١٠-١٤ (في حالة الإصابة الشديدة) - لا تستخدم أكثر من ١,٨٩٣ لتر من المنتج / ٤٠٠ لتر ماء / سنة - لا تستخدم المبيد أكثر من ٦ مرات خلال السنة	١٤
القرعيات، البطيخ، الخيار، الشمام، الكوسا، اليقطين والقرع	الديدان	١٥-٦ مل	في بداية الإصابة ويتم استهداف اليرقات والبيوض .	٧ - لا تستخدم أكثر من ١,٨٩٣ لتر من المنتج / ٤٠٠ لتر ماء / سنة. - لا تستخدم المبيد أكثر من ٤ مرات خلال السنة	٣
الباذنجان، الفاصل الجلو، الفاصل الجار، الباميه، البندورة	الديدان حضار الذرة الأوروبي	١٢-٦ مل	- يتم استخدام المبيد في بداية الموسم على النموات الجديدة والنباتات الصغيرة وعند بداية ظهور آثار التغذية للحشرات على النبات.	٧ - لا تستخدم أكثر من ١,٨٩٣ لتر من المنتج / ٤٠٠ لتر ماء / سنة - لا تستخدم المبيد أكثر من ٤ مرات خلال السنة	٣
		١٢-٢٤ مل	- خلال أو نهاية الموسم وعند الإصابات الشديدة. - في الإصابات الشديدة يتم استخدام المبيد اليرقات في جميع مراحل نموها كل ٧-١٤ يوم.		
	ديدان الثمار وصانعات أنفاق البندوره. (تثبيط فقط)	١٥-٢٤ مل	- يتم استخدام المبيد عند بداية ظهور الآثار التغذوية للحشرات على النبات. - مكافحة صانعات الأنفاق يفضل استخدام المبيد عند بداية وضع البيض.		
الأرضي شوكي	ديدان الجبش الخريفية العث	٢٤-٦ مل	- يتم استخدام المبيد عند بداية فقس البيض أو عند ظهور آثار تغذية الديدان على النبات . - في حالة الإصابات الشديدة تتم إعادة استخدام المبيد من المبيد فابوزايد-٢٤٪ أو أي مبيد آخر بعد ٧ أيام لضمان حماية النموات الجديدة.	٧ - لا تستخدم أكثر من ١,٨٩٣ لتر من المنتج / ٤٠٠ لتر ماء / سنة. - لا تستخدم المبيد أكثر من ٤ مرات خلال السنة	٤

● للحصول على معلومات عن الإسعافات الأولية والتحذيرات راجع الفهرس الخاص بذلك في نهاية الكتاب.

# فابكو

المحصول	الآفة	نسبة الاستعمال / ٢٠ لتر ماء	وقت الاستعمال	الفترة المسموح بها لإعادة استخدام المبيد (أيام)	فترة الأمان (أيام)
العنب	عثة ثمار العنب	١٢-١٨ مل	- يتم استخدام المبيد عند بداية قفص اليبوض لكل جيل.	٢١ - لا تستخدم أكثر من ١,٤٢٠ لتر من المنتج / ٤٠٠ لتر ماء / سنة - لا تستخدم المبيد أكثر من ٤ مرات خلال السنة	٢١
	عثة الكروم الأوروبية فراشة ورق العنب عثة التفاح لغافات الأوراق		- الجيل الربيعي: يتم البدء باستخدام المبيد عند بداية ظهور الإصابة من اليرقات. - الجيل الصيفي: يتم استخدام المبيد عند بداية قفص البيض لكل جيل .		
البصل الأخضر	يرقات الديدان يرقات حفار الذرة	٦-١٢ مل	- يتم استخدام المبيد في بداية الموسم على النموات الجديدة والنباتات الصغيرة عند بداية ظهور اثار التغذية على النبات . - خلال أو نهاية الموسم وعند الاصابات الشديدة - في الاصابات الشديدة ولحماية النموات الجديدة تتم إعادة استخدام المبيد كل ١٠ أيام.	١٠ " للإصابات الشديدة" - لا تستخدم أكثر من ١,٨٩٣ لتر من المنتج / ٤٠٠ لتر ماء / سنة - لا تستخدم المبيد أكثر من ٤ مرات خلال السنة	٣
		١٢-١٨ مل	- يتم استخدام المبيد في بداية الموسم على النموات الجديدة والنباتات الصغيرة عند بداية ظهور اثار التغذية على النبات. - خلال أو نهاية الموسم وعند الاصابات الشديدة. - في حال الاصابات الشديدة تتم إعادة استخدام المبيد خلال ٧-١٤ يوم.		
الفاصولياء الحمراء ، الفاصولياء المكحلة، اللوبياء، البازيلاء، القول	الديدان الحفار	٦-١٢ مل	- يتم استخدام المبيد في بداية الموسم على النموات الجديدة والنباتات الصغيرة عند بداية ظهور اثار التغذية على النبات.	٧ - لا تستخدم أكثر من ١,٨٩٣ لتر من المنتج / ٤٠٠ لتر ماء / سنة - لا تستخدم المبيد أكثر من ٤ مرات خلال السنة	٧
		١٢-٢٤ مل	- خلال أو نهاية الموسم وعند الاصابات الشديدة. - في حال الاصابات الشديدة تتم إعادة استخدام المبيد خلال ٧-١٤ يوم.		
	لثبيط تأثير دودة الذرة	١٥-٢٤ مل	- يتم استخدام المبيد عند بداية ظهور اثار التغذية للحشرات على النبات. - يفضل استخدام المبيد في بداية مرحلة وضع اليبوض لضمان الحماية الكاملة.	٧ - لا تستخدم أكثر من ١,٨٩٣ لتر من المنتج / ٤٠٠ لتر ماء / سنة - لا تستخدم المبيد أكثر من ٤ مرات خلال السنة - يمنع خلط المبيد مع أي مواد مساعدة oxidizing agents - لا تستخدم المبيدات بمعدات الرذاذ متناهي الصفر ULV	٧
	لثبيط تأثير دودة أوراق وثمار البندورة	١٥-٢٤ مل	- يتم استخدام المبيد عند بداية ظهور اثار التغذية للحشرات على النبات. - يفضل استخدام المبيد في بداية مرحلة وضع اليبوض لضمان الحماية الكاملة.		
الجزر، الهندباء، الفجل، السبانخ، الشمندر السكري واللفت.	الديدان	١٢-٢٤ مل	-- يبدأ استخدام المبيد عند ملاحظة وجود اليرقات أو عند ظهور اثار تغذية اليرقات على النبات. - في حال الاصابات الشديدة تتم إعادة استخدام المبيد لحماية النموات الجديدة.	١٤ - لا تستخدم أكثر من ١,٨٩٣ لتر من المنتج / ٤٠٠ لتر ماء / سنة. عدا الفجل لا تستخدم أكثر من ٠,٩٥٠ لتر من المنتج / ٤٠٠ لتر ماء / سنة	٣ عدا الشمندر السكري ٧ أيام

• للحصول على معلومات عن الإسعافات الأولية والتحذيرات راجع الفهرس الخاص بذلك في نهاية الكتاب.

## فابكو

المحصول	الأفة	نسبة الاستعمال / ٢٠ لتر ماء	وقت الاستعمال	الفترة المسموح بها لإعادة استخدام المبيد (أيام)	فترة الأمان (أيام)
التضاح، الأجاص، اسكندنيا والسفرجل	تنبيت عمل عثة الظهر الماسي دودة التضاح، عثة الثمار	٢٤ مل ١٨-٢٤ مل	- يستخدم المبيد عند بداية وضع البيض لكل جيل.	-----	١٤
	لثافات الأوراق، عثة البراعم، عثة التضاح	١٢-٢٤ مل	الجيل الربيعي :- تتم المعاملة ٢-١ مرة خلال فترة سقوط البتلات اعتمادا على مستوى الإصابة. - الجيل الصيفي : تتم المعاملة لأول مرة خلال فترة ذروة وضع البيض الى مرحلة الفقس. - مكافحة لثافات الأوراق يفضل المعاملة في مرحلة تغذية اليرقات	- لا تستخدم أكثر من ١,٨٩٣ لتر من المنتج / ٤٠٠ لتر ماء / سنة - عند الإصابة بديدان الثمار يسمح بإعادة استخدام المبيد خلال ١٠-١٤ يوم من المعاملة	
	عثة براعم التضاح	٩-١٥ مل	يتم المعاملة في مرحلة فقس ١٠-٣٠% من البيوض لكل جيل		
	صانعات الأنفاق	١٢-١٨ مل	الجيل الأول : تتم المعاملة بمرحلة تورد البراعم الى سقوط البتلات. الجيل الثاني والثالث: يتم المعاملة عند بداية فقس البيوض /جيل		
	ديدان الثمار	١٨ مل	يستخدم المبيد في مرحلة فقس البيض أو ظهور أثار تغذية اليرقات على الثبات		
	الذرة البيضاء	حزاز الذرة، حزاز قصب السكر	٦-١٨ مل	- تتم المعاملة في مرحلة فقس البيوض	١٠ "للاصابات الشديدة" - لا تستخدم أكثر من ١,٤٢٠ لتر من المنتج / ٤٠٠ لتر ماء / سنة
الديدان			- تتم المعاملة في مرحلة فقس البيوض		
التنعج	الديدان	١٥-٢٤ مل	- في الإصابات الشديدة استخدم الجرعة الأعلى.	٢١-٤ "للاصابات الشديدة"	١٤
التنعج	الديدان	١٥-٢٤ مل	- في الإصابات الشديدة استخدم الجرعة الأعلى.	٢١-٤ "للاصابات الشديدة"	١٤
الشمش، النتكرين، الدراق، البرقوق والخوخ	عثة التضاح عثة الثمار	١٥-٢٤ مل	- للسيطرة على الاصابات الخفيفة والمتوسطة ابدأ باستخدام المبيد في مرحلة قبل فقس البيوض لكل جيل وقبل ان تخترق اليرقات الثمار .	١٨-١٠ " ويفضل التبادل مع مبيد آخر لتجنب حدوث مناعة للحشرات - لا تستخدم أكثر من ١,٨٩٣ لتر من المنتج / ٤٠٠ لتر ماء / سنة.	١٤
	حزاز الخوخ	١٢-٢٤ مل	- ابدأ باستخدام المبيد في مرحلة بدء فقس البيوض وقبل ان تخترق اليرقات الثمار .	١٤-١٠ - لا تستخدم أكثر من ١,٨٩٣ لتر من المنتج / ٤٠٠ لتر ماء / سنة	
	عثة كروم العنب عثة التضاح لثافات الاوراق		- لضمان أفضل فعالية استخدم المبيد في مرحلة فقس البيوض. - مكافحة يرقات لثافات الأوراق استخدم المبيد في - مرحلة تغذية اليرقات على الثبات. - في الإصابات الشديدة استخدم الجرعة الأعلى.	١٨-١٠ - لا تستخدم أكثر من ١,٨٩٣ لتر من المنتج / ٤٠٠ لتر ماء / سنة	
	ديدان الثمار ديدان ذو الرؤوس الحمراء	١٥-٢٤ مل ١٢-٢٤ مل	- أفضل استخدام للمبيد في بداية مرحلة فقس البيوض أو عند بداية ظهور أثار تغذية اليرقات على الثبات.	١٤-١٠ - لا تستخدم أكثر من ١,٨٩٣ لتر من المنتج / ٤٠٠ لتر ماء / سنة	

● للحصول على معلومات عن الإسعافات الأولية والتحديات راجع الفهرس الخاص بذلك في نهاية الكتاب.

## فابكو

### تحذير :

- لا يستعمل المبيد على المحاصيل غير المذكورة في جدول الاستعمالات مع مراعات فترات الأمان قبل عملية القطف.
- من الجيد استخدام المبيد في مراحل تواجد يرقات الديدان للتقليل من آثار الضرر الناتج عن التغذية.
- لضمان أفضل فاعلية يجب التأكد من تغذية اليرقات من المبيد.
- لا تتم المعاملة في الأوقات أو الأيام التي يكون فيها تقلبات في درجات الحرارة.

### فترة تحريم دخول الحقل المرشوش :

يجب عدم بدخول الحقل المرشوش قبل مرور ٤ ساعات على آخر تطبيق.

### قابلية الخلط :

قابل للخلط مع المبيدات الأخرى ولكن تجنب الخلط مع أية مواد مساعدة "oxidizing agents" ويفضل عمل تجربة مصغرة قبل ٢٤ ساعة من البدء بعملية الرش.