

فايكو

المجمومة:

Acylalanine

فاكوميل - ٣٥%

مبيد فطري زراعي سام
مسحوق قابل للبلل



من المبيدات الفطرية الجهازية الفعالة للقضاء على معظم الأمراض الفطرية.

التركيب : كل كغم يحتوي على :

٣٥% و/و (مادة فعالة)

ميتالاكسيل

الخواص :

فاكوميل- ٣٥% : مبيد فطري جهازي وفعال لمقاومة الأمراض الفطرية التي تصيب المحاصيل الزراعية.

فاكوميل- ٣٥% : يستعمل لمعاملة البذور تحميتها من أمراض التربة.

الاستعمالات :

المحصول	المرض	معدل الاستعمال / ٢٠ لتر ماء	فترة الأمان (أيام)
البطاطا، القرعيات.	البياض الزغبي، اللبحة المتأخرة.	١٥ غم	٧
العنب.	البياض الزغبي.	١٥ - ٢٠ غم	٧
البصل، الثوم.	البياض الزغبي، اللبحة، الاعفان.	٦ - ١٢ غم	٧
نباتات الزينة.	البياض الزغبي.	١٥ غم	---

تحذير : عدم استخدام المبيد إلا على المحاصيل المذكورة في جدول الاستعمالات مع الالتزام بفترات الأمان قبل عملية القطف.

- يمكن استعماله لمعاملة البذور لمقاومة أمراض الأشتال وتستعمل بطريقتين وبشكل عام بنسبة ٢٠٠ غم من المبيد / ١٠٠ كغم بذور .

طريقة العجينة الرطبة :

يضاف بحذر الكمية المقررة من فاكوميل-٣٥% إلى الكمية المناسبة من البذور وتضاف كمية مناسبة من الماء وتخلط معاً جيداً بالخلط من ٣ - ٥ دقائق للتأكد من أن البذور غطيت جيداً بالمبيد .

الطريقة الجافة : استعمل خلط ميكانيكي وتوضع البذور بكمية ٠.٥ - ١ لتر ماء / ١٠٠ كغم بذور وتخلط ١-٢ دقيقة ثم تضاف الكمية المقررة من المبيد فاكوميل-٣٥% ويعاد الخلط ٣ دقائق .

فترة تحريم دخول الحقل المرشوش :

يجب عدم دخول الحقل المرشوش قبل مرور ٤٨ ساعة على آخر معاملة رش.

قابلية الخلط : قابل للخلط مع معظم المبيدات المعروفة ما عدا القلوية منها وينصح بعمل تجربة خلط مصغرة قبل البدء بعملية الرش.

• للحصول على معلومات عن الإسعافات الأولية والتحذيرات راجع الفهرس الخاص بذلك في نهاية الكتاب.