



فابک

المجموعة:

### **Acylalanine**

فاکومیل - ۵%

میرید فطری زراعی سام / حبیبات

مبين فطري جهازي ذو فعالية عالية في القضاء على أمراض التربية الفطرية.

**التركيب**: كل كغم يحتوى على :

٥٪ و / و (مادة فعالة)

میتا لاکسیل

## الخواص:

**فاکومیل** - ۵٪: مبید جهازی و قائی و علاجی.

**فاكوميل - ٥٪:** ذو فعالية عالية تؤمن وقاية للنباتات خلال فترة نموه حيث تعمل مادة ميتا-الاكسبيل الجهازية على تأمين الوقاية للنباتات داخل أنسجتها من أمراض التربة الفطرية على المحاصيل الواردة في حدود الاستعمالات.

الاستعمالات:

**فاكوميل - ٥%** محب جاهز للاستعمال بطريقة النثر ويجب أن يتسرب إلى منطقة الجذور سواء بواسطة المطر أو بالري. بالنسبة للأشجار المثمرة، يجب قبل إضافة **فاكوميل - ٥%** إلى التربة إزالة الأعشاب الموجودة تحت مسقط الأشجار وتنشر المحببات بشكل متساوٍ على سطح التربة وعلى كامل المساحة مسقط الأشجار.

المحصول	المرض	معدل الاستعمال	مواعيد الاستعمال
التفاح، الأ JACKS، الدراق، المشمش، الخوخ، الحمضيات، الزيتون.	عفن الرقبة، عفن الجذور، عفن الساق، العفن البني (التصميغ).	٢٥ - ٥٠ غم / م	الإضافة الأولى : تتم قبل بدء موسم الأمطار الرئيسية. الإضافة الثانية : تبدأ بعد ذلك بـ ١٠-١٢ أسبوعاً. الإضافات الأخرى يجب أن تتم فقط بعد عامين من بدء العلاج.
الفلفل، البازنجان.	عفن الجذور، عفن الساق.	٤ كغم / دونم	يجب أن تتم الإضافة باستخدام طريقة الخطوط بعرض ٤٠-٣٠ سم. الإضافة الأولى يجب أن تتم بشكل إلزامي بعد ٢٠-١٠ يوماً من موعد الزراعة. الإضافة الثانية يجب أن تتم بعد ٦-٨ أسابيع.
التبغ.	عفن الساق الأسود.	٤ كغم / دونم	يتم خلطها ضمن الخطوط المزروعة. يفضل إجراء عملية النثر قبل عملية التشتيل.
الجزر.	عفن البقع المجوفة ( Pythium Complex )	٢,٥ كغم / دونم	الرشة الأولى تبدأ بعد ٦-٨ أسابيع من موعد الزراعة.
الفراولة.	عفن اللب الأحمر، عفن الجذور.	٢ - ١ كغم / دونم او ٢٠٠ - ١٠٠ غم / م	انتشار عرض ٢٠ سم للخط على سطح التربة وأتبع ذلك بالرثي. تتم الإضافة الأولى قبل الزراعة مباشرة.
المسطحات الحضراء.	اللحفة، مرض الذبول، اصفرار المرج، البياض الغربي.	١,٥ كغم / دونم	تعداد العملية بفواصل زمني من ١٠-١١ يوم خلال فترة نشاط المرض على أن لا تتجاوز ٣ إضافات خلال الموسم.

دونم = ١٠٠٠ م<sup>٢</sup>

**تحذير:** عدم استخدام الميد إلا على المحاصيل المذكورة في جدول الاستعمالات.

• للحصول على معلومات عن الإسعافات الأولية والتجذيرات، راجع الفهرس الخاص، بذلك في نهاية الكتاب.

## **فابكو**

### **مدة استهمار الفعالية :**

تتراوح المدة في الظروف العادبة من ١٢ - ٢٠ أسبوعاً. حيث أن المادة الفعالة تصبح جاهزة للتحلل في التربة بعد هطول المطر أو الري، وهناك ضياع قليل جداً للمادة الفعالة بسبب التبخر عند ملامسة المادة للتربة.

### **قابلية الخلط :**

قابل للخلط مع معظم المبيدات المجهزة للنشر، ما عدا القلوية منها وينصح بعمل تجربة خلط مصغرة قبل التطبيق.