



**فابلت**

المجموعة

Phosphonate

# فابلت - ٨٠٪

مبيد فطري زراعي سام / مسحوق قابل للبلل

مبيد فطري جهازي وقائي وعالجي لمكافحة الأمراض الفطرية الواردة في جدول الاستعمالات.

**التركيب :** كل كغم يحتوي على :

٨٠٪ (مادة فعالة) و/و

فوسستيل أنتينيوم

**الخاص :**

**فابلت - ٨٠٪ :** مبيد فطري جهازي ذو تأثير وقائي وعالجي يمتص بسرعة خلال الأوراق والجذور ويتجه إلى أعلى وأسفل النبات.

**فابلت - ٨٠٪ :** يمنع إنبات الأبوااغ وكذلك يمنع تكون الميسيليلوم.

**الاستعمالات :**

الفترة الآمنة (أيام)	ملاحظات	معدل الاستعمال لتتر ماء / ٢٠ غم	طريقة العاملة	المرض	المحصول
١٤	يجري الرش مرة في الشهر	٦٠ غم	رش على الأوراق	البياض الذهبي.	الخيار، البطيخ، الكوسا، الشمام، القرع.
١٤	معاملة واحدة في الشهر	٥٠ غم	رش على الأوراق	البياض الذهبي.	البصل.
١٤	يجب تغطية النبات بشكل جيد	٤٠ غم	رش على الأوراق	تعفن الجذور، الذبول	البنودرة.
١٤	---	٥٠ غم / ٥ غم / ٢ م	رش على الأوراق او سقي	اللفحة النارية، تعفن الجذور (فایتوفتورا)	التفاح، الاجاص.
١٤	معاملة واحدة في الشهر	٥٠ غم / ٥ غم / ٢ م	رش على الأوراق او سقي	تعفن الجذور.	أشجار الفواكه قبل مرحلة الإثمار (النكتارين، الشمش، الدراق، الكرز)
٣	خلط مع التربة ٤٠ غم / ٢ م	٢ م / ١٠ غم	سقي	ذبول البازدارات.	نباتات الزينة.

**تحذير :** عدم استخدام المبيد إلا على المحاصيل المذكورة في جدول الاستعمالات مع الالتزام بفترات الآمان قبل عملية القطاف.

**فتررة تحريم دخول الحقل المرشوش :**

عدم دخول الحقل المرشوش قبل مرور ٢٤ ساعة على آخر تطبيق.

**قابلية الخلط :**

غير قابل للخلط مع المبيدات الزراعية التي تحتوي على المركبات النحاسية والأسمدة الورقية التي تحتوي على النيتروجين والمحاليل الغذائية التي ترش على المجموع الخضري وينصح بعمل تجربة خلط مصفرة قبل التطبيق.

• للحصول على معلومات عن الإسعافات الأولية والتحذيرات راجع المفهرس الخاص بذلك في نهاية الكتاب.