

فابكو

المجموعة:

Aryloxypheno-
xypropionate

فلوازيثاب-١٥%

مبيد عشبي زراعي سام

مركز قابل للاستحلاب



مبيد عشبي جهازى اختياري يستعمل قبل الانبات، شديد الفعالية لمكافحة العديد من الأعشاب الحولية والمعمرة ورفيعة الأوراق في المحاصيل عريضة الأوراق وحقول الفاكهة.

التركيب: كل لتر يحتوي على :

١٥% و / ح (مادة فعالة)

فلوازيثوب -ب-بيوتيل

الخواص:

فلوازيثاب-١٥%: مبيد اختياري ليس له تأثير على المحاصيل عريضة الأوراق.
فلوازيثاب-١٥%: ذو فعالية عالية في مكافحة الأعشاب النجيلية الحولية والمعمرة.
فلوازيثاب-١٥%: مبيد جهازى يمتص سريعا عن طريق الأوراق وينتقل في جميع أجزاء النبات ليؤثر على مناطق النمو وأجزاء النباتات الأخرى وينتهي بالقضاء على الأعشاب الرفيعة "النجيلية" ويبدأ ظهور التأثير بعد يومين من الرش حيث يتوقف نمو الأعشاب وتصبح غير منافسة للمحصول الأساسي وبعد سبعة أيام تبدأ الأعراض بالظهور على الأوراق حديثة النمو وخلال ٣ - ٤ أسابيع يتحول لون الأعشاب الى اللون البنى أو الأحمر الداكن وتعتفن وتموت.

الاستعمالات:

المحصول	الأعشاب	معدل الاستعمال / ٢٠ لتر	عدد الرش / سنة	فترة إعادة التطبيق (أيام)	فترة الامان (أيام)
المشمش، الكرز، النكتارين، الخوخ.	الأعشاب النجيلية	٥٧ مل	٣	٢١	١٤
الجزر	رفيعة الأوراق (الحولية والمعمرة)	٥٧ مل	٢	١٤	٤٥
الجريب فروت، الليمون، البرتقال، البوملي، كمكوات، المندرين.	مثل: النجيل، الدنقة، الزوان، الدقن،	٥٧ مل	٢	١٤	٦٠ لا يطبق المبيد على اللوبياء.
الفاصولياء الجافة.	ذيل الثعلب، الشوفاان	٥٧ مل	٢	١٤	١٤
الخس	البري، القصب وغيرها.	٥٧ مل	٢	١٤	٤٥
البصل		٥٧ مل	٣	١٤	١٤
البصل الأخضر		٥٧ مل	٣	١٤	١٤
محاصيل الفاكهة غير المثمرة: التفاح، الافوكادو، النخيل، التين، الجوافة، المانجا، الزيتون، الأجاص، الرمان.		٥٧ مل	٣	١٤	لا يطبق المبيد على الأشجار التي سيتم حصادها كغذاء أو علف في غضون سنة واحدة بعد التطبيق.

• للحصول على معلومات عن الإسعافات الأولية والتحذيرات راجع الفهرس الخاص بذلك في نهاية الكتاب.

تحذير :

- لا يستعمل المبيد إلا على المحاصيل الواردة في جدول الاستعمالات مع مراعاة فترات الأمان قبل عملية القطف.
- يجب إضافة مادة ناشرة ولاصقة لزيادة فعالية المبيد على أن تكون نسبة المادة الفعالة بالمادة الناشرة أعلى من ٧٥٪
- يجب استخدام كمية كافية من محلول الرش لضمان التغطية الكاملة للأعشاب المستهدفة. يجب استخدام (٤,٧٥ - ٣٨ لتر لكل ١ دونم) من محلول الرش. عند الإصابة الشديدة يجب استخدام ما لا يقل عن ١٩ لتر لكل ١ دونم لضمان التغطية الكاملة للأعشاب.

موعد التطبيق :

- للحصول على أفضل النتائج، يجب تطبيق المبيد خلال بداية تفرع الأوراق عند ارتفاع ٥ سم أثناء ظروف النمو الجيدة. قد يؤدي التطبيق خلال فترات الجفاف الطويلة إلى تقليل الفعالية.
- يجب التأكد من التغطية الشاملة عند الرش لجميع أوراق الأعشاب عند فترة النمو النشط. كما يجب التطبيق على الأعشاب التي لا تتعرض للإجهاد من الرطوبة أو درجة الحرارة أو انخفاض خصوبة التربة أو الإصابة الميكانيكية أو الكيميائية.
- يمكن الحصول على مكافحة مثلى للأعشاب المعمرة إذا تم تقطيع الرايزومات والسيقان الأفقية من خلال ممارسات الحراثة المسبقة لتحفيز ظهور أكبر قدر من براعم العشب
- الخطأ :** املاً خزان الرش بالماء جزئياً وابدأ في التحريك المستمر ثم قم بقياس الكمية المطلوبة من المبيد واسكب المنتج ببطء في خزان الرش ثم أضف باقي الماء أثناء التحريك المستمر

محاذير تطبيق المبيد:

- لا يطبق المبيد على الأعشاب المجعدة بسبب الرطوبة أو درجة الحرارة أو انخفاض خصوبة التربة أو الإصابة الميكانيكية أو الكيميائية.
- لا يطبق المبيد على الأعشاب التي تم حراستها أو الأعشاب التي شكلت رؤوس البذور أو التي تجاوزت مراحل النمو الأولى.
- لا يستخدم المبيد إذا كان من المتوقع هطول الأمطار خلال ساعة واحدة.
- لا يتم زراعة الذرة والذرة الرفيعة والحبوب في غضون ٦٠ يوماً من آخر تطبيق لمبيد الأعشاب **فلوازيغاب-١٥٪**.
- لا يتم زراعة أية محاصيل أخرى في غضون ٣٠ يوماً من آخر تطبيق لمبيد الأعشاب **فلوازيغاب-١٥٪**.
- تجنب انجراف المبيد إلى المحاصيل والمناطق غير المستهدفة

فترة تحريم دخول الحقل المرشوش :

يجب عدم دخول الحقل المرشوش قبل مرور ٤٨ ساعة على آخر معاملة رش.

قابلية الخلط : غير قابل للخلط مع المبيدات الأخرى.