

فايكو

المجموعة :
Synthetic auxin (1)(2)

فلوراتون SL

منظم نمو نباتي
سائل مركز قابل للذوبان



منظم نمو نباتي لزيادة عقد الازهار وتكوين الثمار مما يؤدي الى زيادة الانتاج.

التركيب: كل لتر يحتوي على :

٠,٤٥ غم (مادة فعالة)

الفانثثيل استيك اسيد⁽¹⁾

١,٢٥ غم (مادة فعالة)

الفانثثيل اسيتاميد⁽²⁾

الخواص :

- فلوراتون : مزيج من منظمات النمو النباتية (الاكسينات) لزيادة عقد الازهار وتكوين الثمار مما يؤدي الى زيادة الانتاج.
- فلوراتون : يحسن من تأثير الهرمونات النباتية الاخرى لتحسين وضعية النبات.
- فلوراتون : يحمي النباتات من تأثير الصقيع والحرارة العالية عند استعماله بالوقت المناسب.
- فلوراتون : قابل للخلط مع كافة المبيدات الزراعية والاسمدة الورقية ما عدا القاعدية منها.

الاستعمالات :

ملاحظات	معدل الاستعمال	المحصول
يرش قبل اسبوعين من الإزهار وبعاد الرش ٢-٣ مرات كل ١٠-١٢ يوما حتى سقوط التويجات الزهرية.	٦٠ مل/ ١٠٠ لتر ماء	اشجار الفاكهة : تفاح، اجاص، دراق، خوخ، نكتارين، مشمش.
يرش لحماية الأشجار من خطر الصقيع وقت الإزهار وذلك قبل حدوث الذبول الناتج عن الصقيع.	٦٠ مل/ ١٠٠ لتر ماء	
يرش قبل الإزهار وبعاد الرش كل ١٠ أيام.	٦٠ مل / ١٠٠ لتر ماء	الخضروات : البنندورة، الكوسا، الفلفل، الباذنجان، الطبخ، الشمام، البازيلاء، الفاصولياء، والفراولة.
يرش لتشجيع نمو النباتات في مرحلة الورقتان الى ثلاث ورقات او بعد ١٠-١٥ يوما من التشتيل.	٦٠ مل/ ١٠٠ لتر ماء	

فترة الأمان : ٨-١٢ يوما ويجب التوقف عن قطف الثمار قبل مرور ٢٠ يوما بعد المعاملة .

ارشادات حول الاستعمال :

- الالتزام بمعدلات الاستعمال وعدم تجاوزها حيث يتغير تأثير الهرمون على النبات بتغير معدلات الاستعمال.
- عدم الرش في درجات الحرارة المرتفعة.
- يجب ايصال فلوراتون لجميع اجزاء النبات.
- تتأثر نتائج فلوراتون على النبات بالظروف الجوية السائدة عند الرش.
- يجب أن لا تكون النباتات تحت تأثير العطش او نقص السماد عند استعمال فلوراتون.
- يفضل عدم رشه على الخيار.

قابلية الخلط :

قابل للخلط مع معظم المبيدات الحشرية والفطرية والاسمدة الورقية ويجب عدم خلطه مع منظمات النمو الأخرى او مزيج بورددو وينصح بعمل تجربة خلط مصغرة قبل التطبيق.

• للحصول على معلومات عن الاسعافات الأولية والتحذيرات راجع الفهرس الخاص بذلك في نهاية الكتاب.