

فابكو

المجموعة :
Synthetic auxin (1)(2)

فلوراتون SP

منظم نمو نباتي

مسحوق قابل للذوبان في الماء



منظم نمو نباتي لزيادة عقد الأزهار وتكوين الثمار مما يؤدي الى زيادة الانتاج.

التركيب: كل كغم يحتوي على :

٠,٤٥ غم (مادة فعالة)

الفانثثيل استيك اسيد^(١)

١,٢٥ غم (مادة فعالة)

الفانثثيل سيثاميد^(٢)

الخواص :

فلوراتون: مزيج من منظمات النمو النباتية (الاكسينات) لزيادة عقد الأزهار وتكوين الثمار مما يؤدي الى زيادة الانتاج.
فلوراتون: يحسن من تأثير الهرمونات النباتية الأخرى لتحسين وضعية النبات.
فلوراتون: يحمي النباتات من تأثير الصقيع والحرارة العالية عند استعماله بالوقت المناسب.
فلوراتون: منظم نمو نباتي فعال للأشجار المثمرة والتي تعاني من نقص في تكوين الثمار مثل التفاحيات (التفاح والأجاص) واللوزيات (الدراق والخوخ) وغيرها.

الاستعمالات :

ملاحظات	معدل الاستعمال	المحصول
يرش قبل أسبوعين من الإزهار ويعاد الرش ٢-٣ مرات كل ١٠-١٢ يوما حتى سقوط التويجات الزهرية. يرش لحماية الأشجار من خطر الصقيع وقت الإزهار وذلك قبل حدوث الذبول الناتج عن الصقيع.	٦٠ غم/١٠٠ لتر ماء	أشجار الفاكهة : تفاح، اجاص، دراق، خوخ، تكتارين، مشمش.
يرش قبل الإزهار ويعاد الرش كل ١٠ أيام. يرش لتشجيع نمو النباتات في مرحلة الورقتان الى ثلاث ورقات او بعد ١٠-١٥ يوما من التشتيل.	٦٠ غم/١٠٠ لتر ماء	الخضروات : البندورة، الكوسا، الفلفل، الباذنجان، البطيخ، الشمام، البازيلاء، الفاصولياء، والفراولة.

فترة الأمان :

بعد ٢٠ يوم من آخر معاملة رش.

ارشادات حول الاستعمال :

- الالتزام بمعدلات الاستعمال وعدم تجاوزها حيث يتغير تأثير الهرمون على النبات بتغير معدلات الاستعمال.
- عدم الرش في درجات الحرارة المرتفعة.
- يجب إيصال فلوراتون لجميع أجزاء النبات.
- تتأثر نتائج فلوراتون على النبات بالظروف الجوية السائدة عند الرش.
- يجب أن لا تكون النباتات تحت تأثير العطش او نقص السماد عند استعمال فلوراتون.
- يفضل عدم رشه على الخيار.

قابلية الخلط :

قابل للخلط مع معظم المبيدات الحشرية والفطرية والأسمدة الورقية ويجب عدم خلطه مع منظمات النمو الأخرى او مزيج بورديو يعمل تجربة خلط مصغرة قبل التطبيق.

• للحصول على معلومات عن الإسعافات الأولية والتحذيرات راجع الفهرس الخاص بذلك في نهاية الكتاب.