

فابكو

المجموعة:

Phthalamide

فولدان - ٥٠٪

مبيد فطري زراعي سام

مسحوق قابل للبلل



مبيد فطري وقائي يعمل عن طريق الملامسة يكافح العديد من الأمراض الفطرية على المحاصيل الزراعية الواردة في جدول الاستعمالات.

التركيب : كل كغم يحتوي على :

٥٠٪ و/و (مادة فعالة)

فولت

الخواص :

فولدان- ٥٠٪ : مبيد فطري وقائي يعمل بالملامسة.

فولدان- ٥٠٪ : فعال لمكافحة العديد من الأمراض الفطرية الأكثر تدميراً وتكلفة على العديد من المحاصيل الزراعية الواردة في جدول الاستعمالات.

فولدان- ٥٠٪ : ذو سمية منخفضة للشديدات والعديد من الحشرات النافعة والحيوانات البرية.

الاستعمالات :

المحصول	المرض	معدل الاستعمال / ٢٠ لتر ماء	عدد الرشاشات في الموسم	فترة الأمان (أيام)
الاجاص.	الجرب، تبقع الأوراق، البياض الدقيقي.	٥٠ غم	١٠	٢١
التفاح.	الجرب، تبقع الأوراق، البياض الدقيقي.	٤٠ غم	كل ١٤ يوم	٢١
الحمضيات.	انثراكنوز، الموت الرجعي، التصدع.	٦٠ غم	---	٢١
العنب.	البياض الزغبي، البياض الدقيقي، العفن البني، موت الاطراف .	٦٠ غم	كل ١٤ يوم	٨
الزيتون.	تبقع عين الطاووس، الذبول.	٣٠ غم	---	١٠
المشمش، الخوخ، الدراق، اللوز .	تجمع الأوراق، انثراكنوز، البياض الدقيقي، تبقع الأوراق.	٥٠ غم	٣	١٠
القرع ، الكوسا، الخيار.	البياض الدقيقي، البياض الزغبي، تعفن الساق، انثراكنوز.	١٥ غم	---	٧
الباذنجان، البازيلاء.	البياض الدقيقي، اللبحة المبكرة، اللبحة المتأخرة .	٣٠ غم	---	١٠
البقوليات.	البياض الدقيقي، تبقع الأوراق.	٧ - ٨ غم	---	١٠
الخس.	البياض الزغبي، العفن الرمادي.	٤٠ غم	أسبوعياً	١١
الشمام.	البياض الزغبي، البياض الدقيقي، عفن الساق، انثراكنوز.	٤٠ غم	أسبوعياً	٧
البصل.	التلطيخ الأرجواني، عفن الرقبة والأوراق.	٤٠ - ٥٠ غم	٢ - ٣	٧
الفلفل.	الذبول، عفن الساق، البياض الدقيقي.	١٠ - ٣٠ غم	٣ - ٤	٧

• للحصول على معلومات عن الإسعافات الأولية والتحذيرات راجع الفهرس الخاص بذلك في نهاية الكتاب.

فابكو

المحصول	المرض	معدل الاستعمال / ٢٠ لتر ماء	عدد الرشاشات في الموسم	فترة الأمان (أيام)
البطاطا.	اللفحة المتأخرة، اللفحة المبكرة.	٦٠ غم	أسبوعياً	١٤
البندورة.	اللفحة المتأخرة، اللفحة المبكرة.	٤٠ غم	أسبوعياً	١٤
البطيخ.	البياض الزغبي، البياض الدقيقي، عفن الساق، انشراكنوز.	٥٠ غم	١ - ٢	٧

تحذير : عدم استخدام المبيد إلا على المحاصيل المذكورة في جدول الاستعمالات مع الالتزام بفترات الأمان قبل عملية القطف.

السمية للنبات :

غير ضار بالنباتات باستثناء الأصناف التالية : الكرز الحلو، بعض أنواع الكمثرى، وبعض أنواع التفاح الحساسة وهذه الانواع قد تكون حساسة لهذا المبيد عند المعاملة المبكرة قبل الجني.

SWEET CHERRIES, D'ANJOU VARIETY OF PEARS AND SENSITIVE
APPLE VARIETIES.

فترة تحريم دخول الحقل المرشوش :

يجب عدم دخول الحقل المرشوش قبل مرور ٢٤ ساعة على آخر معاملة رش.

قابلية الخلط :

قابل للخلط مع معظم المبيدات ما عدا المواد شديدة القلوية ويفضل استعمال المبيد فوراً بعد الخلط، وينصح بعمل تجربة خلط مصغرة قبل الرش.

* اسماء تجارية اخرى : فولبي- ٥٠ % .

• للحصول على معلومات عن الإسعافات الأولية والتحذيرات راجع الفهرس الخاص بذلك في نهاية الكتاب.