



فابكو

المجموعة:

Copper Compound

كبروكسيد - ٧٧٪

مبيد فطري زراعي سام

مسحوق قابل للبلل

مبيد فطري بكتيري وقائي ذو مجال واسع على عدد كبير من المحاصيل الزراعية الواردة في جدول الاستعمالات.

التركيب: كل كغم يحتوي على:

٧٧٪ و/و (مادة فعالة)

هيدروكسيد النحاس

(و تعادل نحاس مادة فعالة ٥٠٪ و/و)

الخواص:

كبروكسيد - ٧٧٪ : مبيد فطري وبكتيري فعال عن طريق الملامسة في مقاومة الأمراض الفطرية والبكتيرية التي تؤثر على المحاصيل الزراعية الواردة في جدول الاستعمالات.

كبروكسيد - ٧٧٪ : يقاوم البكتيريا التي تسبب الأمراض للمحاصيل الزراعية مثل مرض الدموع.

الاستعمالات:

فترات الأمان (أيام)	معدل الاستعمال / لتر ماء	المرض	المحصول
١٥	٣٥ - ٥٠ غم	تنقب الأوراق، العفن، تجعد الأوراق.	اللوز، المشمش، الخوخ، الدراق، الكرز.
١٥	٥٠ - ٧٠ غم	انشراكتون، التبقع الأسود، اللحمة التاربة.	التفاح، الاجاص.
٢١	٤٥ - ٩٠ غم	العفن الأسود.	الحمضيات.
٧	١٧ - ٣٥ غم	انشراكتون، البياض الذهبي، مرض الدموع.	الكوسا.
١٠	٢٠ غم	اللحفات، انشراكتون.	الباذنجان.
١٠	٤٠ - ٤٥ غم	التبقع البكتيري، اللحمة المبكرة، اللحمة المتأخرة، انشراكتون.	البنودرة.
١٥	١٠ - ٤٥ غم	اللحمة المبكرة والمتأخرة.	البطاطا.
٢١	٣٥ - ٤٠ غم	تبقع عين الطاووس.	الزيتون.

تحذير:

- عدم استخدام المبيد إلا على المحاصيل المذكورة في جدول الاستعمالات مع الالتزام بفترات الأمان قبل عملية القطف.

- يسبب حساسة على بعض أنواع التفاح (التفاح الأحمر)، وقد يتسبب بحدوث ضرر لأوراق البرقوق والدراق خاصة عند درجات الحرارة المنخفضة.

ملاحظة: يستخدم داخل البيوت البلاستيكية على البنودرة، الفلفل، الباذنجان.

فتره تحرير دخول الحقل المرشوش: يجب عدم دخول الحقل المرشوش قبل مرور ٤٨ ساعة على آخر معاملة رش.

قابلية الخلط: قابل للخلط مع معظم المبيدات المعروفة وغير قابل للخلط مع الأحماض أو سلفات الكالسيوم وينصح بعمل تجربة خلط مصغرة قبل الرش بـ ٢٤ ساعة.

* أسماء تجارية أخرى: هابكبرو - WP ٥٠٪

• للحصول على معلومات عن الإسعافات الأولية والتحذيرات راجع الفهرس الخاص بذلك في نهاية الكتاب.