

فابكو

الجموعة :  
Nitroguanidine

كوماندو - ٧٠%



مبيد حشري زراعي سام  
مسحوق قابل للانتشار في الماء لتعقيم البذار (WS)

التركيب : كل كغم يحتوي على :

٧٠% و ( مادة فعالة )

اميداكلوبريد

الخواص :

كوماندو-٧٠% : مبيد جهازى ذو فعالية عالية.

كوماندو-٧٠% : فعال في معالجة البذور على نطاق واسع من المحاصيل مثل : البطاطا، الذرة، الشمندر السكري، الحبوب.

كوماندو-٧٠% : يفتك بالحشرات الناقلة للفيروسات مما يحد من انتشار تلك الفيروسات بواسطة معالجة البذور.

كوماندو-٧٠% : يعطي حماية من وقت الإنبات الى الفترة التي يصبح بها النبات مقاوم جيد للحشرات.

الاستعمالات :

المحصول	الأفة	معدل الاستعمال
البطاطا	الديدان السلكية. المن، خنفساء كلرادو. نطاط الأوراق.	٥٠ - ٧٠ غم / ١٠٠ كغم بذور. ١٥ - ٣٠ غم / ١٠٠ كغم بذور. ٣٠ غم / ١٠٠ كغم بذور.
الذرة	الديدان السلكية، يرقات الخنافس القارضة للأوراق، المن، ذبابة الأوراق، نطاط الأوراق والجاسيدات. التريس.	٥٠٠ - ٧٠٠ غم/ ١٠٠ كغم بذور . ١٠٠٠ غم/ ١٠٠ كغم بذور .
الشمندر السكري	المن، الديدان السلكية، ذبابة الشمندر، الخنفساء البرغوثية، سوسة جذور الشمندر.	١٣٠ غم/ ١٠٠,٠٠٠ بذرة . ( ١٠٠٠٠٠٠ بذرة = ١ كغم ) .
الحبوب : القمح، الشعير، دوار الشمس، البقوليات.	المن. الديدان السلكية.	٥٠ - ١٠٠ غم/ ١٠٠ كغم بذور . ١٠٠ - ١٥٠ غم/ ١٠٠ كغم بذور .

تحذير :

- عدم استعمال المبيد على المحاصيل غير الواردة في جدول الاستعمالات.

- يمنع استخدام البذور المعاملة للإستهلاك البشري.

طريقة التحضير (الرتبية) :

يمزج ١ جزء من كوماندو-٧٠% مع ١,٥ - ٢ جزء من الماء. يمكن استعمال الخليط الخاص بالأسمت لضمان تغطية كاملة للبذور على أن لا يستعمل إلا لهذه الغاية وعدم استعماله للأسمت. ولتحسين التصاق المبيد بالبذور يمكن استعمال مادة لاصقة مناسبة.

بعد عملية معالجة البذور إذا بقيت البذور رطبة يمكن أن تترك لتجف قبل حفظها.

قابلية الخلط : قابل للخلط مع جميع مقدمات البذور الفطرية والحشرية وينصح بعمل تجربة خلط مسفرة قبل التطبيق.

\* أسماء تجارية أخرى : جاولش - ٧٠% WS .

• للحصول على معلومات عن الإسعافات الأولية والتحذيرات راجع الفهرس الخاص بذلك في نهاية الكتاب.