

فابك

المجموعة :
Aryloxyphenoxy-propionate

كويزوفاب - ٥%

مبيد عشبي زراعي سام
مركز قابل للاستحلاب



مبيد عشبي اختياري يمتص عن طريق سطح الأوراق وينتقل من خلال أوعية اللحاء والخشب ويترافق في الأنسجة المرستيمية.

التركيب: كل لتر يحتوى على :

٥٪ (مادة فعالة) و/ح

كويزوفوب-ب-ايثيل

الغواص:

كويزوفاب-٥٪، مبيد عشبي اختياري يمتص عن طريق سطح الأوراق وينتقل من خلال أوعية اللحاء والخشب ويترافق في الأنسجة المرستيمية.

كويزوفاب-٥٪، مبيد عشبي اختياري يستعمل بعد الإثبات لمكافحة الأعشاب الحولية والمummerة على المحاصيل الوارد ذكرها في جدول الاستعمالات.

الاستعمالات: لمكافحة الأعشاب الشتوية – Boom Spryer

المحصول	الاعشاب	عمر الاعشاب	معدل الاستعمال	فترات الأمان	فترات التحرير لحيوانات الرعي	ملاحظات
الشندر الملفوف الجزر	الشيلم البري، الشويعرة	عندما تكون الأعشاب في مرحلة ٣ أوراق.	٧٥ مل /دونم	١٤ يوم	٩ اسابيع	- يرش في مرحلة النمو النشيط للأعشاب. -
	الشعير بري، قمح بري.	عندما تكون الأعشاب في مرحلة ٣ أوراق.	٥٠ مل /دونم	١٤ يوم	١٠ اسابيع	- تستخدم الجرعة الادنى عندما تكون الأعشاب كثيفة أو عند بداية مرحلة الأشطاء.
الزهرة الحمص البرسيم الخيار	الشونافان البري	عندما تكون الأعشاب في مرحلة ٣ أوراق.	٥٠-٢٥ مل /دونم	٢٨ يوم	١٢ اسبوع	- يرش في مرحلة النمو النشيط للأعشاب.
				١٤ يوم	—	-
الفول البازيلاء البطيخ البصل البطاطا اليقطين	الشونافان البري	عندما تكون الأعشاب في مرحلة ٣ أوراق.	٥٠-٢٥ مل /دونم	٢٨ يوم	١٢ اسبوع	- يرش في مرحلة النمو النشيط للأعشاب. -
				٢٨ يوم	١٤ يوم	- تستخدم الجرعة الادنى عندما تكون الأعشاب قليلة الكثافة او عندما تكون الأعشاب في مرحلة ٣-٤ أوراق. -
البندوره				١٨ اسبوع	٩ اسابيع	- تستخدم الجرعة الادنى عندما تكون الأعشاب كثيفة أو عند بداية مرحلة الأشطاء.
				١٠ اسابيع	٩ اسابيع	-
				٢١ يوم	٤ اسابيع	-

دونم = ١٠٠٠ م²

فابكو

مكافحة الأعشاب الصيفية - Boom Spryer

المحصول	الاعشاب	عمر الاعشاب	معدل الاستعمال	فتره الآمان	فتره التحرير لحيوانات الرعي	ملاحظات
الشندر	النجيل	عندما تكون الأعشاب في مرحلة ٤-٢ اوراق.	١٠٠ مل /دونم	١٤ يوم	---	- يرش في مرحلة النمو النشيط للأعشاب. - استخدم هذه الجرعة فقط عندما يكون عمر النجيل أقل من شهرين ومتفرق من بذور.
الملفوف	حشيشة جونسون	عندما تكون الأعشاب في مرحلة ٢ ورقة الى مرحلة ٣ أوراق.	١٥٠ مل /دونم	٩ اسابيع	١٤ اسبوع	- يرش في مرحلة النمو النشيط للأعشاب. - تستخدم الجرعة الاعلى عندما تكون الاشتاب كثيفة أو عند بداية مرحلة الأشطاء.
الزهرة						
الجزر						
الخيار						
فاصوليا						
خضراء						
البطيخ						
البصل						
البطاطا						
اليقطين						
الفجل						
فول الصويا						
دور الشمس						
البنادورة						

دونم = ١٠٠٠ م²

تحذير : يمنع استعمال المبيد على المحاصيل غير الواردة في جدول الاستعمالات.

تبيهات:

- يجب معالجة آلة الرش قبل البدء بالمعالجة.
 - يفضل إضافة مادة ناشئة ومبللة مثل سوبر سيرفكس عند رش المبيد.
 - يجب عدم رش المحاصيل وهي تحت تأثير الضغط المتسبب عن الطقس البارد الشديد، الأمراض، الحفاف، الغمر بالماء.
 - يجب عدم رش الأعشاب وهي تحت تأثير الضغط المتسبب عن الظروف المناخية (الجفاف، الغمر بالماء) او ان تكون الأعشاب غير نشطة النمو عندما تكون الأعشاب تحت الضغط تتأثر بنسبة قليلة بالمبادات، وان النتائج تكون قتلت غير مكتمل للاعشاب و تكون تأثير المبيد على الحشائش فقط.
 - لا يستخدم الرش عند ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض الرطوبة.
 - يجب اعادة الرش اذا سقطت الامطار خلال ٣ ساعات.
 - يجب عدم زراعة محاصيل الحبوب الا بعد مرور ١٨ أسبوع على آخر معاملة.
 - يوصى باستخدام مضخة خاصة لرش المبيد واذا تعدد ذلك ففيجب غسل المضخة جيداً قبل استعمالها مرة أخرى.
 - يجب عدم زراعة محاصيل الحبوب الا بعد مرور ١٨ أسبوع على آخر معاملة.
 - يستخدم ما بين ٥٠ و ١٠٠ لتر من محلول الرش الجاهز / هكتار.
 - إذا كانت الأعشاب كثيفة يوصى بزيادة الحجم إلى ١٥٠ لترانا من محلول الرش الجاهز / هكتار.
 - يجب عدم رش المبيد عند وصول المحصول إلى مرحلة الورقة الخامسة لكل من محاصيل (ال الخيار، اليقطين والبطيخ).
 - استخدم المنشآت ذات الفوهات المخروطية الموجفة عند (Pa 210-350) لإعطاء توزيع متباين للرش
- فتره تحرير دخول الحقل المرشوش:** يجب عدم دخول الحقل المرشوش قبل مرور ٢٤ ساعة على آخر معاملة رش.
- فتره تحرير دخول الحقل المرشوش لحيوانات الرعي:**
 يمنع رعي أو تغذية الحيوانات على محصولي البرسيم والبازيلاء إلا بعد مرور ١٤ يوم على آخر معاملة رش اما بقية المحاصيل إلا بعد مرور ١٢ أسبوع على آخر معاملة رش.
- قابلية الخطاط:**
 قابلة للخلط مع مبيدات الأعشاب الخاصة بمكافحة الأعشاب العريضة وينصح بعمل تجربة خلط مصغرة قبل الرش.