



**فابك**

المجموعة:  
Benzoylurea

# موسيف - ٥%

مبيد حشري وللحلم زراعي سام  
مركز قابل للاستحلاب

منظم نمو حشري غير جهازي لمكافحة الحشرات مثل حرشفية الاجنحة، وعمدية الاجنحة، وهدبيات الاجنحة، ومتشابهة الاجنحة والحلم.

التركيب: كل لتر يحتوي على :

٥ % و/ح (مادة فعالة)

ليوفينورون

الخواص:

موسيف - ٥% : مبيد حشري وللحلم غير جهازي يعمل عن طريق المعدة وبشكل جيد عن طريق الملامسة.  
موسيف - ٥% : منظم نمو حشري يعمل على تثبيط تكوين الكيتيين في الطبقة الخارجية للأطوار غير الكاملة للحشرات وبالتالي تجعل عملية الانسلاخ غير ناجحة، فعال ضد اليرقات مثل حرشفية الاجنحة، وعمدية الاجنحة، وهدبيات الاجنحة، متتشابهة الاجنحة والحلم.  
موسيف - ٥% : يعمل في مراحل تطور حياة الحشرة ولا يقتضي على الحشرة الكاملة كما ان له فعالية عالية في درجات الحرارة العالية أكثر من درجات الحرارة المنخفضة.

الاستعمالات:

الفترة الأمان (أيام)	معدل الاستعمال / لترماء	الافعنة	المحصول
٧	١٦-١٠ مل	دودة ثمار البنودرة	البنودرة
٧	١٦-١٠ مل	دودة ثمار البانجان، نطااطات الاوراق	البانجان
٧	١٦-١٠ مل	دودة أوراق الفاصولياء، نطااطات الاوراق	الفاصولياء
١٤	١٦-١٠ مل	عنزة الظهر المasaki، فراشاة الملفوف، الديدان القاراضة	الملفوف
١٤	١٦-١٠ مل	عنزة الاوراق	البصل
١٤	٢٠-١٥ مل	حشر الساق	الذرة
١٤	٧-٥ مل	فراشة درنات البطاطا	البطاطا
٢١	٤٠-١٠ مل ١٥ مل	صاعات الأنفاق الحلم الصدئي	الحمضيات
١٤	٢٠-١٥ مل	عنزة هريان العنبر	العنبر
٢١	٢٠-١٥ مل	التفاح، المراق، اللوز، الكرز، دودة الشمار، صانعات الأنفاق على شممش الأجاجص، التكتاريين	التفاح، البراعم، بسيلا الأجاجص

تحذير:

عدم استعمال المبيد على المحاصيل غير المذكورة في جدول الاستعمالات مع الالتزام بفترات الأمان قبل عملية القطف.

فتره تحرير دخول الحقل المشوش: يجب عدم دخول الحقل المشوش قبل مرور ٢٤ ساعة على آخر معاملة رش.

قابلية الخلط:

غير قابل للخلط مع المواد ذات التأثير القلوي (النحاس، الكبريت الجيري) ويصبح بعمل تجربة خلط مصغره قبل الرش.

\* للحصول على معلومات عن الإسعافات الأولية والتحذيرات راجع الفهرس الخاص بذلك في نهاية الكتاب.