



# فابك

المجموعة:

Semicarbazone

# ميتاهاپ - ٢٤%

مبيد حشري زراعي سام  
مركز معلق

مبيد حشري له تأثير معموي ، فعال لمكافحة صناعية الانفاق (توتا ابسولوتا) في محصول البنودرة وفعال لمكافحة الحشرات المذكورة في جدول الاستعمالات.

**التركيب:** كل لتر يحتوي على :

٢٤٪ و/ح (مادة فعالة)

ميتاهاپوميزون

**الخواص:**

مبيتاهاپ - ٢٤٪ : يحتوي على المادة الفعالة ميتاهاپوميزون والتي تعمل على غلق قنوات الصوديوم.

مبيتاهاپ - ٢٤٪ : يعمل المبيد عن طريق المعدة بعد تغذية الحشرات على أجزاء النبات العاملة بمبيد حيث تتوقف الحشرات عن التغذية ثم تصاب بالشلل والموت خلال ١١٢ إلى ٧٢ ساعة.

**الاستعمالات:**

| الفترة الأمان (أيام) | عدد مرات الرش للموسم | موعد الرش   | معدل الاستعمال / لتر ماء | الآلة  | المحصول                        |
|----------------------|----------------------|---|--------------------------|--|--------------------------------|
| ٧                    | ٢                    | يتم الرش في مرحلة البرقات عند بداية نمو النبات.     | ٢٠ مل                    | يرقات الديدان القارضة،<br>يرقات صناعة الانفاق (البيوت البلاستيكية) | البنودرة                       |
| ٧                    | ٢                    | في حالة الإصابة الشديدة، كرر الرش بعد ١٠ - ١٥ أيام. | ١٥ - ٢٠ مل               | يرقات الديدان القارضة،<br>يرقات صناعة الانفاق (الحقول المفتوحة)    | البنودرة                       |
| ٧                    | ٢                    |   | ٢٨ - ١٤ مل               | يرقات الديدان القارضة  | الباذنجان<br>(الحقول المفتوحة) |
| ٣                    | ٢                    |   | ١٨ - ١١ مل               | يرقات الديدان القارضة،<br>فراشة الملفوف                            | الملفوف                        |
| ٧                    | ٢                    |   | ١٨ - ٢٥ مل               | يرقات الديدان القارضة  | الخس                           |
| ٧                    | ٢                    | يرش عندما تضع الحشرة بيوضها قبل الفقس               | ٢٠ مل                    | يرقات الديدان القارضة  | الفلفل<br>(البيوت البلاستيكية) |

**تحذير:**

- تجنب استعمال المبيد على المحاصيل غير الواردة في جدول الاستعمالات مع الالتزام بفترات الأمان قبل عملية القطف.
- للتقليل من احتمال ظهور المقاومة لحشرة "توتا ابسولوتا" يوصى بتناول المبيد ميتاهاپ - ٢٤٪ مع المبيدات الأخرى التي لا تحتوي المادة الفعالة ميتاهاپوميزون

**فترات تحريم دخول الحقل المرشوش:**

يجب عدم دخول الحقل المرشوش قبل مرور ٢٤ ساعة على آخر معاملة رش .

**قابلية الخلط:**

قابل للخلط مع معظم المبيدات المعروفة ما عدا القلوية منها، إلا أنه ينصح بإجراء تجربة خلط مصغر على نطاق ضيق قبل عملية الرش.

\* أسماء تجارية أخرى: كربالنيت - ٢٤٪

• للحصول على معلومات عن الإسعافات الأولية والتحذيرات راجع الفهرس الخاص بذلك في نهاية الكتاب.