

فابكو

المجموعة:

Aminobenzoic  
Acids

نو-بيرد

منفر للطيور  
مركز قابل للذوبان



نو-بيرد منفر للطيور، لحماية الثمار والخضراوات والمحاصيل الأخرى.

التركيب: كل لتر يحتوي على:

٢٦,٤ ٪ و/ح (مادة فعالة)

ميثيل انثرانايلات

الخواص:

نو-بيرد: يمنع الطيور المضرة من التغذي على الثمر ينفرها منه.

نو-بيرد: يجعل البذار والبراعم والثمار غير لذيدة كالأطعام للطيور وبذلك يقلل الضرر الناتج إلى حد أدنى.

نو-بيرد: يتناسب كليا مع النباتات ولا يؤثر على نكهة البذار أو الثمر أو الخضروات.

الاستعمالات:

| مساحة الرش            | ملاحظات   | معدل الاستعمال<br>/ ٢٠ لتر ماء | المحصول                                    |
|-----------------------|---|--------------------------------|--|
| ٩٣ متر مربع           | ينصح بالرش عند نضوج الثمار وبدء تغذية الطيور.<br>يجب إعادة الرش كل ٥-٨ أيام في حالة ظهور الطيور مرة أخرى. | الحد الأعلى ٢٠٠-١٢٠٠ مل        | المشمش، الكرز، الدراق<br>الخوخ، النكتارين. |
|                       |   | الحد الأدنى ٣٤-٢٠٠ مل          | التوت                                      |
|                       |   | الحد الأعلى ٢٠٠-٤٠٠ مل         | العنب                                      |
|                       |   | الحد الأدنى ٣٤-٦٨ مل           | دوار الشمس                                 |
|                       |   | ٢٠٠ مل                         | التفاح، الاجاص                             |
|                       |   | الحد الأعلى ٢٠٠-١٢٠٠ مل        |  |
| الحد الأدنى ٣٤-٢٠٠ مل |   |                                |  |

**تحذير:** يجب رش جميع اجزاء النباتات المعرضة لخطر الطيور رشاً جيداً.

**فترة الأمان:** ما بين المعالجة الأخيرة وجمع المحصول ٥-٨ أيام.

**طريقة التحضير:**

املاً وعاء الرش إلى النصف بالماء ثم أضف كمية المبيد المطلوبة ثم أضف باقي كمية الماء وحرك جيداً.

• للحصول على معلومات عن الإسعافات الأولية والتحذيرات راجع الفهرس الخاص بذلك في نهاية الكتاب.