

فابكو

المجموعة:

N-Phenyloxadiazolone

هيربستار - ٢٥٪

مبيد عشبي زراعي سام
مركز قابل للاستحلاب



مبيد عشبي انتقائي يستعمل قبل الإنبات لمكافحة الأعشاب الحولية عريضة الأوراق.

التركيب: كل لتر يحتوي على :

٢٥٪ و/ح (مادة فعالة)

أوكساديازون

الخواص:

هيربستار - ٢٥٪ : مبيد عشبي انتقائي يستعمل قبل الإنبات لمكافحة العديد من الأعشاب الحولية عريضة الأوراق.

هيربستار - ٢٥٪ : يعمل على تأمين مكافحة طويلة الأمد عند استعماله مرة واحدة خلال الموسم.

هيربستار - ٢٥٪ : لا يتأثر المبيد بالحرارة أو الضوء كما انه لا يتطاير ويبقى على سطح التربة لمدة طويلة.

الاستعمالات:

المحصول	الاعشاب	موعد الاستعمال	نسبة الاستعمال
البصل.	الاعشاب الحولية عريضة الاوراق.	يرش على محصول البصل في وقت مبكر بعد أن تصبح البادرات طولها ١٥ سم أي بعد تكوين الورقة الثالثة أو بعد نقل الاشتال بمدة ٢٠-٣٠ يوم كما ويستعمل بعد البذار مباشرة.	٢٠٠ - ٣٠٠ مل / دونم حسب كثافة الاعشاب
التوم.		يرش قبل انبات الاعشاب.	
الفول، كروم العنب، وبساتين المشمش، الدراق، الخوخ، الكرز، البرقوق، التفاح، الإجاص، نباتات الزينة		يرش قبل انبات الاعشاب.	

دونم = ١٠٠٠ م²

تحذير: لا يستعمل المبيد إلا على المحاصيل المذكورة في جدول الاستعمالات ، مع الالتزام بفترات التحريم لدخول الإنسان للحقول والحيوانات للمراعي .

ارشادات :

- يجب معايرة آلة الرش قبل البدء بالمعالجة.

- يجب عدم عزق التربة بعد عملية الرش.

- يجب أن تكون التربة رطبة عند الرش حتى يعطي فعالية عالية.

- لا يؤثر على الأعشاب التي تتكاثر بواسطة الأبصال والرايزومات.

- لا يترك رواسب عند حصاد محصول البصل.

- تأثير المبيد بالملاسة فقط.

فترة تحريم دخول الحقل المرشوش: يجب عدم دخول الحقل المرشوش قبل مرور ٢٤ ساعة على آخر معاملة رش.

فترة تحريم الرعي للحيوانات:

يجب عدم رعي الحيوانات في المناطق المعاملة ووضع لافتة بأن الحقل مرشوش لمدة ٢٤ ساعة.

* أسماء تجارية أخرى : روتاج - ٢٥٪ EC .

• للحصول على معلومات عن الاسعافات الأولية والتحذيرات راجع الفهرس الخاص بذلك في نهاية الكتاب.