

فابك

المجموعة :

Aryloxyphenoxypropionate

هيريشوك - ٢٤%



مبيد عشبي زراعي سام

مركز قابل للاستحلاب

مبيد عشبي انتقائي لمكافحة الأعشاب الرفيعة والحولية مثل الشوفان البري و حشيشة الكناري (شعير الفار) في حقول القمح.

التركيب: كل لتر يحتوي على:

٤٪ و / ح (مادة فعالة)

كلودينافوب بروبارجيل

الغواص:

هيريشوك - ٢٤٪ : مبيد عشبي جهازي انتقائي يستخدم بعد الاتبات في الفترة النشطة في نمو الأعشاب، حيث تظهر أعراض المكافحة من ١ إلى ٣ أسابيع بعد تطبيق المبيد والذي يؤثر على الأنسجة الانشائية.

الاستعمالات:

فترات الأمان (أيام)	موعد الاستعمال		معدل الاستعمال	الأعشاب	المحصول
	الاعشاب	المحصول			
٦٠	مرحلة ١ - ٦ أوراق على الجعد الرئيسي عند نشاط نمو الأعشاب.	قبل ظهور الورقة الرابعة في مرحلة الاشطاء	٢٣٠ مل / هكتار	الشوفان البري	القمح
	مرحلة ١ - ٥ أوراق على الجعد الرئيسي عند نشاط نمو الأعشاب.			حشيشة الكناري (شعير الفار)	

هكتار = ١٠ دونم دونم = ٢ م²

تحذير:

عدم استخدام المبيد الا على المحاصيل الواردة في جدول الاستعمالات مع الالتزام بفترات الأمان قبل عملية القطاف.

ارشادات:

- يتم تخفيض المبيد بكمية من الماء لا تقل عن ٢٠٠ - ١٠٠ لتر/هكتار.
- لا يتم الرش أثناء خطول الأمطار الا بعد ساعتين.
- لا يتم الرش عندما يكون النبات في حالة إجهاد مثل أن يكون هناك جفاف للتربة، رطوبة عالية، نقص عناصر، إصابات حشرية أو مرضية أو عند حدوث الصقيع.
- يجب معالجة آلة الرش قبل البدء بالكافحة.
- يجب أن يكون الرش متساوياً ومتجانساً في كل المناطق المراد معاملتها.
- لا ينصح بحصاد المحصول قبل ٦٠ يوم من المعاملة.
- تجنب تطبيق المبيد على محصول الشعير أو أي محصول آخر غير القمح. لا يسمح للرش بالانجراف، أو النطاف إلى الحقول المجاورة المزروعة بمحاصيل أخرى غير القمح.
- يمكن خلط المبيد بمادة مساعدة غير أنيونية كما في النسب الموضحة في جدول استعمالات المادة المساعدة.

• للحصول على معلومات عن الإسعافات الأولية والتحذيرات راجع الفهرس الخاص بذلك في نهاية الكتاب.

فابكو

فترة تحرير دخول الحقل المرشوش:

يجب عدم دخول الحقل المرشوش قبل مرور ٢٤ ساعة على اخر معاملة رش.

فترة تحرير دخول الحيوانات للرعى:

لا يسمح بالرعى إلا بعد مرور ٧٢ ساعة من معاملة الحقل بالمبيد ويمنع دخول الحيوانات للرعى في المناطق المرشوشة.

قابلية الخلط:

- يمكن خلط المبيد مع غيره من المبيدات المعروفة بشرط اتباع جميع التعليمات الخاصة بالخلط والمذكورة في ملصقات المبيدات التي سيتم خلطها مع المبيد هيربيشو^ك-٢٤٪ . واتباع احتياطات الرش والقيود وتناوب المحاصيل وتوقيت التطبيق وفترات ما قبل الحصاد والذكورة في ملصقات المبيدات التي سيتم خلطها مع المبيد هيربيشو^ك-٢٤٪ .
- يجب عمل تجربة خلط مبدئية قبل خلط المبيد مع غيره من المبيدات العشبية وتجربتها على نطاق ضيق تجنباً ل أي حساسية للمحصول.

* للحصول على معلومات عن الإسعافات الأولية والتحذيرات راجع الفهرس الخاص بذلك في نهاية الكتاب.