

فابكو

المجموعة:
Diamide

فابوجين - ٢٠٪

مبيد حشري زراعي سام
مركز معلق



مبيد حشري جهازي يعمل بشكل اساسي عن طريق المعدة وثنائي بالملاسة يستخدم على نطاق واسع من المحاصيل الزراعية (الاشجار، الخضروات، وغيرها من المحاصيل الزراعية).

التركيب: كل لتر يحتوي على :

٢٠٪ و/ ح (مادة فعالة)

كلورانترايليبيرول

الخواص:

فابوجين- ٢٠٪ : مبيد فريد يتكون من المادة الفعالة كلورانترايليبيرول لمكافحة عدد كبير من الحشرات
فابوجين- ٢٠٪ : يعمل بشكل جهازي عند تطبيقه على التربة عند منطقة الجذر بحيث ينتقل من الاسفل الى الاعلى، بالإضافة الى نفاذيته داخل انسجة النبات عند رشه على المجموع الخضري.
فابوجين- ٢٠٪ : فعال بشكل كبير في مرحلة اليرقات وله تأثير على البيوض في العديد من الحشرات.
فابوجين- ٢٠٪ : يستخدم كجزء من برنامج مكافحة المتكاملة IPM

الاستعمالات:

المحصول	الافقة	الرش الخضري ٢٠ / لتر ماء	الري بالتنقيط ٢٠ / لتر ماء	معاملة التربة / ٢٠ لتر ماء	عدد مرات الرش / محصول	الفترة بين الرشات (ايام)	فترة الأمان (ايام)
البصل، الثوم، الكراث	دودة الشمندر القارضة	١١-٥ مل	---	---	٤	٧	٣
البروكلي، الملفوف، الخردل، الزهرة، الكرنب	دودة الشمندر القارضة، عثة الظفر الماسي، عثة الملفوف، دودة كوز الذرة، دودة الملفوف	١١-٥ مل	١١-٥ مل تتم المعاملة بالتنقيط الثاني من مراحل النمو	١١-٥ مل	٤ للرش ٢ الخضري، ١ للري بالتنقيط، ١ لمعاملة التربة	٣ ايام للرش الخضري، ١٠ ايام للري بالتنقيط،	٣
الشعير، الشوفان، الشيلم، القمح	دودة كوز الذرة، دودة الشمندر القارضة، دودة الحشد الخريفية، حفار ساق الذرة	١١-٥ مل	---	---	٤	٧	٣
الذرة	دودة كوز الذرة، حفار ساق الذرة، دودة الشمندر القارضة، دودة الحشد الخريفية	١١-٥ مل	---	٧ - ١١ مل	٤ للرش الخضري	٧	٣
	نشاطات	٧-٣ مل					

• للحصول على معلومات عن الاسعافات الأولية والتحذيرات راجع الفهرس الخاص بذلك في نهاية الكتاب.

فابكو

المحصول	الأفة	الرش الخضري ٢٠ / لتر ماء	الري بالتنقيط ٢٠ / لتر ماء	معاملة التربة / ٢٠ لتر ماء	عدد مرات الرش / محصول	الفترة بين الرشات (أيام)	فترة الأمان (أيام)
الخيار، الباميا، البطيخ، الشمام، الكوسا، القرع، البقطين	دودة الشمندر القارضة، عثة الملفوف	١١ - ٥ مل	١١ - ٥ مل	١١ - ٥ مل	٤ للرش الخضري،	٥ أيام للرش الخضري،	٣
	صانعات الانفاق (يرقة) ، الذبابة البيضاء (حورية)	١١ - ٧ مل	١١ - ٧ مل	١١ - ٧ مل	٢ للري بالتنقيط،	١٠ أيام للري بالتنقيط	
	ديدان البطيخ	٥ - ٣ مل	٥ - ٣ مل	٥ - ٣ مل	١ لمعاملة التربة		
البادنجان، الفلفل الحار، الفلفل الحلو، البندورة	دودة الشمندر القارضة، دودة الحشد الخريفية، العث، دودة ثمار البندورة، دودة براعم البندورة	١١ - ٥ مل	١١ - ٥ مل	١١ - ٥ مل	٤ للرش الخضري،	٥ أيام للرش الخضري،	٣
	صانعات الانفاق (يرقة) ، الذبابة البيضاء (حورية)	١١ - ٧ مل	١١ - ٧ مل	١١ - ٧ مل	٢ للري بالتنقيط، ١ لمعاملة التربة	١٠ أيام للري بالتنقيط	
الكرفس، السبانخ، البقدونس، الخنس	دودة الشمندر القارضة، عثة الظهر الماسي، دودة كوز الذرة، عثة الملفوف، دودة براعم التبغ	١١ - ٥ مل	١١ - ٥ مل	١١ - ٥ مل	٤ للرش الخضري،	٣ أيام للرش الخضري،	٣
	صانعات الانفاق (يرقة) ، الذبابة البيضاء (حورية)	١١ - ٧ مل	١١ - ٧ مل	١١ - ٧ مل	٢ للري بالتنقيط، ١ لمعاملة التربة	١٠ أيام للري بالتنقيط	
	نطاطات	٧ - ٥ مل	---	---			
الفول، البازيلاء، الفاصولياء، الحمص	دودة كوز الذرة، دودة الشمندر القارضة، حفار ساق الذرة، دودة الحشد الخريفية، عثة الملفوف	١١ - ٥ مل	---	١١ - ٧ مل	٤ للرش الخضري،	٣ أيام للرش الخضري	٣
	صانعات الانفاق (يرقة) ، الذبابة البيضاء (حورية)	١١ مل	---	---	١ لمعاملة التربة		
	نطاطات	٣ - ٧ مل	---	---			
النعنع	دودة الحشد الخريفية، الديدان القارضة، العث	١١ - ٥ مل	---	---	٤ للرش الخضري	١٤ يوم للرش الخضري	٣

• للحصول على معلومات عن الإسعافات الأولية والتحذيرات راجع الفهرس الخاص بذلك في نهاية الكتاب.

فابكو

المحصول	الألفة	الرش الخضري ٢٠ / لتر ماء	الري بالتنقيط ٢٠ / لتر ماء	معاملة التربة / ٢٠ لتر ماء	عدد مرات الرش / محصول	الفترة بين الرشات (ايام)	فترة الامان (ايام)
البطاطا	دودة الشمندر القارضة، عثة الملفوف، دودة كوز الذرة، فراشة درنات البطاطا	٥ - ١١ مل	---	---	٤ للرش الخضري	٥ ايام للرش الخضري	١٤
	نطاطات	٣ - ٧ مل					
الشمندر، اللفت، الجزر، الفجل، البطاطا الحلوه	دودة الشمندر القارضة	٥ - ١١ مل	---	---	٤ للرش الخضري	١٣ ايام للرش الخضري	٣
	نطاطات	٥ - ٧ مل					
الفراولة	دودة الشمندر القارضة، عثة الملفوف، دودة كوز الذرة، عثة التفاح	٥ - ١١ مل	---	---	٤ للرش الخضري	٧ ايام للرش الخضري	٣
قصب السكر	حفار قصب السكر، حفار الارز	٥ - ١١ مل	---	---	٤ للرش الخضري	٧ ايام للرش الخضري	٣
	نطاطات	٣ - ٧ مل					
التبغ	عثة درنات البطاطا، دودة براعم التبغ، دودة البندورة، دودة التبغ	٥ - ١١ مل	---	٧ - ١١ مل	٤ للرش الخضري، ١ لمعاملة التربة	١٣ ايام للرش الخضري	٣

• للحصول على معلومات عن الاسعافات الأولية والتحذيرات راجع الفهرس الخاص بذلك في نهاية الكتاب.

فابكو

تحذير:

- لا يستعمل المبيد إلا على المحاصيل المذكورة في جدول الاستعمالات مع مراعاة فترة الامان قبل عملية القطف.
- لا يتم معاملة الاشتال بالمبيد فابوجين - ٢٠ % .
- لا يتم استخدام المبيد فابوجين - ٢٠ % بالمشاتل أو بيوت التشتيل، أو في البيوت البلاستيكية المتضمنة الاشتال التي يتم تحضيرها للزراعة.
- لا يرش المبيد فابوجين - ٢٠ % على نباتات الزينة أو النباتات التي تزرع لأغراض الزينة.
- **لمعاملة التربة :** الحد الاعلى المسموح به ١١ مل / ٢٠ لتر ماء للمحصول .
لمعاملة التنقيط :
- يجب ان يتم استخدام المبيد فابوجين - ٢٠ % بجانب منطقة الجذر.
- يجب ان يتم التحكم بالرري لضمان بقاء المبيد فابوجين - ٢٠ % ضمن منطقة الجذر.
- يتم استعمال المبيد فابوجين - ٢٠ % بعد انبات المحصول.
- لا يتم استخدام المبيد فابوجين - ٢٠ % إذا كانت الرطوبة بالحد الأدنى للسماح بنمو المحصول.
- **لكافحة عثة الظهر الماسي :**
- لا يتم استخدام المبيد فابوجين - ٢٠ % لأكثر من مرتين بالجيل الواحد أو قبل مرور ٣٠ يوم على الرشة الأولى.
- **لكافحة النطاطات :**
- يتم رش المبيد فابوجين - ٢٠ % عند تواجد النطاطات بحيث يتم تطبيق المبيد فابوجين - ٢٠ % بمرحلة الحوريات ويجب ضمان التغطية الشاملة
- يتم اضافة مادة ناشرة بمعدل ١ % و/و من حجم محلول الرش وذلك عندما تفقس البيوض وتكون غالبية النطاطات بمرحلة الطور الثاني والثالث، ويتم استخدام مبيدات أخرى بالرشة الثانية لضمان عدم حدوث مناعة للمبيد.
- يتم استخدام الجرعة الاعلى عندما تكون الاصابة بالحد الاعلى.
- افضل موعد لرش عندما تكون الحشرات بمرحلة وضع البيض و/أو فقس البيض و/أو اليرقات حديثة الفقس وقبل أن تصل الحشرات إلى مستويات الضرر .

فترة تحريم دخول الحقل المرشوش:

يجب عدم دخول الحقل المرشوش قبل مرور ٢٤ ساعة على آخر معاملة رش .

قابلية الخلط :

غير قابل للخلط مع الأسمدة السائلة، وينصح بعمل تجربة خلط مصغرة قبل التطبيق.