



المجموعة:  
Cinnamamide<sup>(1)</sup>  
Dinitroaniline<sup>(2)</sup>

# دايفلونام - ٤٠%

مبيد فطري / مركز معلق

مبيد فطري جهازي يعمل بـالملامسة، لمكافحة العديد من الامراض الفطرية على المحاصيل الواردة في جدول الاستعمالات

التركيب: كل لتر يحتوي على:

دايميثومورف<sup>(1)</sup> ٢٠٪ و/ح (مادة فعالة)  
فلوازينام<sup>(2)</sup> ٢٠٪ و/ح (مادة فعالة)

الخواص:

دايفلونام - ٤٠٪: مبيد فطري ورقي وقائي يعمل بـالملامسة.

دايفلونام - ٤٠٪: مبيد يستخدم قبل ظهور المرض ويستخدم ببرامج رش متتابعة.

دايفلونام - ٤٠٪: مبيد يستخدم لمكافحة العديد من الامراض الفطرية على المحاصيل المذكورة في جدول الاستعمالات.

الاستعمالات:

الفترة الآمنة (أيام)	معدل الاستعمال	المرض	المحصول
٧	٧٥ مل / ١٠٠ لتر ماء	اللختة المتأخرة، الاعفان	البطاطا
٧	٧٥ مل / ١٠٠ لتر ماء	الاعفان	الخضروات
١٤	٧٥ مل / ١٠٠ لتر ماء	الاعفان	العنب
٧	٥٠ مل / ١٠٠ لتر ماء	البياض الذهبي	الشمام

تحذير:

- تجنب استعمال المبيد على المحاصيل غير الواردة في جدول الاستعمالات مع الالتزام بفترات الآمان قبل القطف.
- يمكن رشه حتى ٥ مرات في الموسم.
- لا يمكن استخدامه مع انظمة الري.

موعد الرش:

- الرشة الاولى: الرش عندما تكون الظروف ملائمة لحدوث المرض، قبل ظهور المرض.
- الرشة الثانية: خطير الاصابة قليل: ١٤ يوم بين الرشتين، خطير الاصابة عالي: ١٠ أيام بين الرشتين.

قابلية الخلط:

قابل للخلط مع معظم المبيدات والاسمدة الورقية، ويفضل عمل تجربة خلط مبدئية قبل الرش.