

دسترين

بودرة للتعفير
للاستعمال الفوري
مبيد حشري

التركيب: كل غم يحتوي على:

50 ملغم

ملاثيون

الخواص :

- مبيد حشري فسفوري عضوي ومبيد للحلم ، غير جهازي يعمل بالملامسة وعن طريق المعدة والجهاز التنفسي.
- ذو فاعلية شديدة وسمية متدنية.

الإستعمالات:

- القضاء على الطفيليات الخارجية (القملة والبراغيث والقراد والجرب والذباب) التي تهاجم الدواجن والضأن والماعز والابقار والجمال والخيول والارانب والكلاب والقطط والطيور البرية (الفري والحجل الخ).
- مكافحة التدويد (برقات الذباب والحشرات التي تتوضع في الجروح).
- مكافحة الذباب والبعوض والصراصير والحشرات الاخرى والتي تتواجد داخل او خارج بيوت الحيوانات والدواجن، والمنازل والمزارع والمرافق العامة.

طريقة الاستخدام : (للتعفير مباشرة).

- يتم تعفير الجسم جيداً وخصوصاً بين ثنيات الجلد ومنطقة الاذن ، وتحت الاجنحة وحول فتحة المخرج (عند تعفير الطيور)؛ مع ضرورة عدم تلووث العيون؛ ثم اجراء الفك الجيد باليد بين الصوف/الشعر/الفراء/الريش. (15 غم/طير، 50غم/حيوان).
- الحيوانات الحلابية: يتم التعفير بعد عملية الحلب، مع ضرورة غسل الضرع جيداً قبل اجراء عملية الحلب التالية.
- تجنب تلووث المعالف والمشارب والبيض ومعدات واوعية الحلابية.
- يمكن تكرار التعفير كل اسبوعين عند الضرورة.
- يتم تعفير الاسطبلات وحظائر الابقار والاعنام والمواليد والدواجن(الاقفاص والاعشاش ومجاثم الطيور) واماكن ابواء الكلاب والسلال التي تنام فيها القطط ،وكذلك المزارع والمرافق العامة؛مع الاهتمام والتركيز على الزوايا والشقوق حيث تختبئ الحشرات فيها. (بينتر 75-125غم/متر مربع من الارض او الفرشة الجافة قدر الامكان).

تحذيرات:

- سام للاسماك والنحل .
- تجنب ملامسة العيون او الفم او الجلد او الاستنشاق.
- نيتعي ارتداء الملابس الواقية والقفازات وواقي الوجه قبل الاستعمال.
- تجنب الاكل والشرب والتدخين اثناء التعفير .
- لا ينصح بتعفير الحيوانات المريضة او المنهكة او صغيرة السن.

- يجب عدم تلويث البرك ومصادر وقنوات المياه.
- يجب التخلص من العبوات الفارغة بطريقة سليمة، وعدم استخدامها لاجراض اخرى.

الاسعافات الاولية:

- في حالة الابتلاع:
 - اجراء التقيؤ (فقط) بلمس الاصبع لمنطقة البلعوم.
 - اجراء غسيل معدة.
- عند ملامسة العيون: تغسل جيداً بالماء لمدة ربع ساعة.
- عند الاستنشاق: يتم اجراء التنفس الاصطناعي واعطاء الاوكسجين عند الضرورة.
- عند ملامسة الجلد: يغسل جيداً بالماء والصابون.
- طلب المساعدة الطبية عند الضرورة.

الترياق المضاد:

- الاتروبيين، بام، توكسوجونين.
- الاستمرار بالمعالجة حسب اعراض التسمم.

فترة الامان:

- لاستهلاك اللحوم: اسبوع.

التخزين:

- يحفظ بعيداً عن متناول الأطفال، والطعام والشراب.
- يحفظ في مكان جاف معتم وبدرجة حرارة أقل من 30 °م.

للاستعمال البيطري فقط