

## سايرمثرين - 10 %

مبيد حشري بايرثرودي  
مركز مستحلب

التركيب: كل مل يحتوي على:

سايرمثرين 100 ملغم

الخواص:

- مبيد حشري بايرثرودي غير جهازي، ويعمل باللامسة وعن طريق المعدة.
- ملائم لاستعماله لحيوانات المزرعة.
- يتحلل عضوياً بسهولة مما يجعله غير ضار بالبيئة ولا يتراكم في الحليب او الانسجة.
- يقضي بسرعة على جميع انواع القراد وخصوصاً التي تقاوم المبيدات الحشرية الفسفورية والكلورينية العضويتين.
- له تأثير فعال عند استعماله بتركيزات منخفضة، بالإضافة الى سميته المتدنية للحيوانات الثديية.

الاستعمالات:

- معالجة اصابات الجرب المختلفة التي تصيب حيوانات المزرعة.
- مكافحة الطفيليات الخارجية مثل القراد والقملة والبراغيث والديدان الحلزونية وغيرها والتي تهاجم الابقار والضأن والماعز والجمال.
- مكافحة الذباب والحشرات المزعجة الاخرى في المزارع والاسطبلات والحظائر.

طريقة الاستعمال : بالرش او التغطيس بعد التخفيف بالماء كما يلي:

نوع الحيوان	نسبة التخفيف في الماء
الابقار والجمال	1000:1
ذباب الابقار	300:1
الضأن والماعز	800:1
الدواجن	750:1
	بالرش (60 لتر لكل 1000 طير)
المزارع والاسطبلات	50:1

### تحذيرات:

- سام للأسماك والنحل.
- تجنب معالجة الحيوانات المريضة والمنهكة والضعيفة وصغيرة السن.
- تجنب ملامسة العيون والفم والجلد والاستنشاق.
- قبل الرش، ينبغي ارتداء الملابس والاحذية والقفازات والنظارات الواقية.
- تجنب الاكل والشرب والتدخين اثناء عملية الرش.
- تجنب تلويث البرك ومصادر وقنوات المياه.
- لا يسمح للمواليد بالرضاعة من امهاتها بعد التعطيس او الرش بالمبيد الحشري الا بعد ان تجف الامهات تماماً من محلول المبيد.

### الاسعافات الاولية:

- في حالة الابتلاع:
  - تجنب اجراء التقيؤ.
  - اجراء غسيل معدة.
- عند ملامسة العيون: تغسل جيداً بالماء لمدة ربع ساعة.
- عند الاستنشاق: يتم اجراء التنفس الاصطناعي واعطاء الاوكسجين عند الضرورة.
- عند ملامسة الجلد: يغسل جيداً بالماء والصابون.
- طلب المساعدة الطبية عند الضرورة.

### الترياق المضاد:

- غير محدد، وتتم المعالجة حسب الاعراض.
- في حالة حدوث التشنجات، يعطى المريض ديازيبام.

### فترة الامان:

- لاستهلاك اللحوم والحليب: اسبوع.

### التخزين:

- يحفظ بعيداً عن متناول الاطفال، والطعام والشراب.
- يحفظ في مكان جاف معتم وبدرجة حرارة أقل من 30 °م.

العبوات: (1، 5، 20) لتر.