



# فابكوزين - 12.5 %

مبيد حشري ومبيد للحلم  
 مركز مستحلب

التركيب: كل مل يحتوي على:

125 ملغم

اميتراز

## الخواص:

- مبيد حشري ومبيد للحلم (من مجموعة الاميديين) غير جهازي، ويعمل باللامسة وعن طريق الجهاز التنفسي.
- يتميز بتأثيره القوي ضد انواع القراد وخاصة تلك التي تقاوم المبيدات الحشرية الزنبيخية والفسفورية والكلورينية العضويتين.
- يتحلل عضوياً في التربة بسرعة ، مما يجعله غير ضار بالبيئة ولا يسبب تلوثها.
- ذو سمية متدنية للحيوانات الثديية.
- قوة طاردة تسبب السحب السريع لاجزاء فم الحشرة من جسم العائل وسقوطها.

## الاستعمالات:

- معالجة الانواع المختلفة من الجرب.
- مكافحة الانواع العديدة من الطفيليات الخارجية مثل القراد والقملة والبراغيث والذباب التي تهاجم الضأن والماعز والابقار والجمال والكلاب.
- مكافحة الذباب والحشرات الاخرى في المزارع والحظائر .
- يقضي على يرقات الذباب عند رشه على اماكن تولدها.

طريقة الاستعمال: بالرش او التغطيس بعد التخفيف بالماء كما يلي:

نوع الحيوان	نسبة التخفيف الاولي	فترة الاستعمال	نسبة التعويض
الابقار والجمال: القراد والقملة الجرب	700:1	كل 7-10 ايام	نسبة التعويض هي نصف النسبة المستخدمة في التخفيف الاولي
	500:1	كل 12 يوماً	
الضأن والماعز: القراد الجرب القملة	700:1	عند الحاجة	
	250:1	عند الحاجة	
	250:1	كل 10-12 يوماً	
الكلاب: القراد والجرب الحظائر	250:1	كل 10 ايام	
	4-2 %	عند الحاجة	

## تحذيرات:

- سام للخيل والاسماك.

- تجنب ملامسة العيون والفم والجلد والاستنشاق.
- قبل الرش، ينبغي ارتداء الملابس والأحذية والقفازات والنظارات الواقية.
- تجنب الأكل والشرب والتدخين أثناء عملية الرش.
- تجنب تلويث البرك ومصادر وقنوات المياه.
- لا يجب استخدام مادة الأميتراز للحيوانات التي لديها حساسية مفرطة لهذه المادة
- لا يعطى للحيوانات الأقل عمراً من 4 أشهر
- يجب أخذ الحيطة والحذر عند استخدام الفابكوزين للحيوانات التي تعاني من السكري
- يجب أخذ الحيطة و الحذر عند استخدام الفابكوزين للكلاب الصغيرة
- ممكن حدوث تفاعلات دوائية عند اعطاء الفابكوزين مع المستحضرات الستيرويدية و مركبات الأزاثيوبرين
- لا يسمح للمواليد بالرضاعة من امهاتها بعد التغطيس او الرش بالمبيد الحشري الا بعد ان تجف الامهات تماماً من محلول المبيد.

### الاسعافات الاولية:

- في حالة الابتلاع:
  - تجنب اجراء التقيؤ.
  - غسل الفم جيداً بالماء.
  - شرب كوبين من الماء.
  - اجراء غسيل معدة.
- عند ملامسة العيون: تغسل جيداً بالماء لمدة ربع ساعة.
- عند الاستنشاق: يتم اجراء التنفس الاصطناعي واعطاء الاكسجين عند الضرورة.
- عند ملامسة الجلد: يغسل جيداً بالماء والصابون.
- طلب المساعدة الطبية عند الضرورة.

### الترياق المضاد:

- غير محدد وتتم المعالجة حسب الاعراض.

### فترة الامان:

- لاستهلاك اللحوم:
  - الاغنام و الماعز: 7 أيام.
  - الابقار: يوم واحد.
- لاستهلاك الحليب: يومان.

### التخزين:

- يحفظ بعيداً عن متناول الاطفال، والطعام والشراب.
- يحفظ في مكان جاف معتم وبدرجة حرارة أقل من 30 °م.