

فابكوزين - 20 %

مبيد حشري ومبيد للحلم
مركز مستحلب

التركيب: كل مل يحتوي على:

200 ملغم

اميتراز

الخواص:

- مبيد حشري ومبيد للحلم (من مجموعة الاميديين) غير جهازى، ويعمل باللامسة وعن طريق الجهاز التنفسي.
- يتميز بتاثيره القوي ضد انواع القراد وخاصة تلك التي تقاوم المبيدات الحشرية الزرنيخية والفسفورية والكلورينية العضويتين.
- يتحلل عضوياً في التربة بسرعة ، مما يجعله غير ضار بالبيئة و لا يسبب تلوثها.
- ذو سمية متدنية للحيوانات الثديية.
- قوة طاردة تسبب السحب السريع لاجزاء فم الحشرة من جسم العائل وسقوطها.

الاستعمالات:

- معالجة الانواع المختلفة من الجرب.
- مكافحة الانواع العديدة من الطفيليات الخارجية مثل القراد والقملة والبراغيث والذباب التي تهاجم الضأن والماعز والابقار والجمال والكلاب.
- مكافحة الذباب والحشرات الاخرى في المزارع والحظائر.
- يقضي على يرقات الذباب عند رشه على اماكن تولدها.

طريقة الاستعمال: بالرش او التغطيس بعد التخفيف بالماء كما يلي:

نوع الحيوان	نسبة التخفيف الاولي	فترة الاستعمال	نسبة التعويض
الابقار والجمال: القراد والقملة الجرب	1100:1 800:1	كل 7-10 ايام كل 12 يوماً	نسبة التعويض هي نصف النسبة المستخدمة في التخفيف الاولي
الضأن والماعز: القراد الجرب القملة	1100:1 400:1 400:1	عند الحاجة عند الحاجة كل 10-12 يوماً	
الكلاب: القراد والجرب	400:1	كل 10 ايام	
الحظائر	1- 2 %	عند الحاجة	

تحذيرات:

- سام للخيل والاسماك.
- تجنب ملامسة العيون والفم والجلد والاستنشاق.
- قبل الرش، ينبغي ارتداء الملابس والاحذية والقفازات والنظارات الواقية.
- تجنب الاكل والشرب والتدخين اثناء عملية الرش.
- تجنب تلويث البرك ومصادر وقنوات المياه.
- لا يجب استخدام مادة الأميترالز للحيوانات التي لديها حساسية مفرطة لهذه المادة
- لا يعطى للحيوانات الأقل عمراً من 4 أشهر
- يجب اخذ الحيطه والحذر عند استخدام الفابكوزين للحيوانات التي تعاني من السكري
- يجب أخذ الحيطه و الحذر عند استخدام الفابكوزين للكلاب الصغيرة
- ممكن حدوث تفاعلات دوائية عند اعطاء الفابكوزين مع المستحضرات الستيرويدية و مركبات الأزاثيوبرين
- لا يسمح للمواليد بالرضاعة من امهاتها بعد التعطيس او الرش بالمبيد الحشري الا بعد ان تجف الامهات تماماً من محلول المبيد.

الاسعافات الاولية:

- في حالة الابتلاع:
 - تجنب اجراء التقيؤ.
 - غسل الفم جيداً بالماء.
 - شرب كوبين من الماء.
- عند ملامسة العيون: تغسل جيداً بالماء لمدة ربع ساعة.
- عند الاستنشاق: يتم اجراء التنفس الاصطناعي واعطاء الاوكسجين عند الضرورة.
- عند ملامسة الجلد: يغسل جيداً بالماء والصابون.
- طلب المساعدة الطبية عند الضرورة.

الترياق المضاد:

- غير محدد وتتم المعالجة حسب الاعراض.

فترة الامان:

- لاستهلاك اللحوم:
 - الاغنام و الماعز: 7 أيام.
 - الابقار: يوم واحد.
- لاستهلاك الحليب: يومان.

التخزين:

- يحفظ بعيداً عن متناول الاطفال، والطعام والشراب.
- يحفظ في مكان جاف معتم وبدرجة حرارة أقل من 30 °م.

للإستعمال البيطري فقط