

# فلوميبيور

مبيد مركز بايريشرويدي

التركيب: كل مل يحتوي على:

10 ملغم

فلومثرين

## الإستطابات:

- تستخدم في الأبقار اللاحمة و الطوب بما فيها الحوامل.
- مكافحة القراد و الجرب و القمل الماص و العاض في الأبقار.

الجرعات: ( تتم المعالجة لمدة 14 يوم حسب شدة الإصابة و يوضع المستحضر على ظهر الحيوان من بين الكتف لغاية الذيل.

## لمكافحة القراد و القمل العاض:

- 1 مل من المحلول لكل 10 كغم وزن الجسم.
- 1 ملغم فعالية كغم وزن الجسم.

## لمكافحة القمل الماص و الجرب:

- 2 مل من المحلول لكل 10 كغم وزن الجسم.
  - 2 ملغم فعالية كغم وزن الجسم.
- في الحالات الشديدة يمكن تكرار المعالجة بعد 14 يوم

## فترة الأمان:

- لإستهلاك اللحوم: 5 أيام بعد آخر معالجة.
- لإستهلاك الحليب: 10 أيام بعد آخر معالجة.

## التخزين:

- يحفظ في مكان جاف معتم و بدرجة حرارة أقل من 30<sup>0</sup> م.

للإستعمال البيطري فقط