

### أمبيفاب - 50 % بودرة قابلة للذوبان في الماء للدواجن والعجول والحملان والسخول

التركيب: كل غم يحتوي على:-

ملغم 500

أمبيسيلين ترايهدرات

#### الخواص:

هو بنسلين شبه اصطناعي ذو نشاط واسع النطاق ضد عدد كبير من البكتيريا سالبة الجرام وبعض البكتيريا إيجابية الجرام. يعمل كمبيد للجراثيم عن طريق التدخل في تركيب جدار الخلية للبكتيريا.

#### دواعي الإستعمال:

- يستخدم لعلاج التهاب الأمعاء في العجول والحملان والسخول الناتج عن الإشريكية القولونية، والالتهاب الرئوي الناجم عن الباستوريلا مالتوسيدا، والالتهابات الناجمة عن السالمونيلا دبلن.
- في الدواجن، فعال في علاج التهابات الأمعاء والتهابات الشعب الهوائية الناجمة عن بكتيريا الإشريكية القولونية، والسالمونيلا، والكلسترودية.
- يستخدم لعلاج التهاب الجلد الناجم عن المكورات العقدية. علاج التهاب الأمعاء الناجم عن الإشريكية القولونية والكامبيلوباكتر سبوترام والكلوستريديا بيرفرينجز؛ علاج التهابات الجهاز البولي التناسلي التي تسببها كورينباكتيريام.

#### الجرعة:

- عن طريق الفم مع مياه الشرب أو مع الحليب. يجب تنظيف أنظمة مياه الشرب جيدا قبل وبعد استخدام المنتج.
  - **العجول والحملان والسخول:** 20 – 40 ملغم لكل كغم من وزن الجسم مرتين يوميا لمدة 5 أيام.
  - **الدواجن:** تستخدم كمية المنتج كما هو موضح في الجدول في 1000 لتر من ماء الشرب.
- | العمر بالأيام - جرام المنتج | 250     | 7-0 |
|-----------------------------|---------|-----|
| 305                         | 14 – 8  |     |
| 363                         | 21 – 15 |     |
| 421                         | 28 – 22 |     |
| 486                         | 35 – 29 |     |
| 557                         | 42 – 36 |     |
- يجب استخدام مياه الشرب المعالجة خلال 4 ساعات.



# فابكو

## شركة مصانع الأدوية البيطرية والزراعية ذ.م.م



### موانع الاستعمال:

- لا يجوز استخدامه للمجترات البالغة.
- لا يجوز استخدامه في الحيوانات التي تعاني من اختلال وظائف الكلى.
- لا يستخدم لعلاج الالتهابات التي تسببها الكائنات الحية الدقيقة المنتجة للبنسلينيز.
- لا يجوز تطبيقه على الحيوانات شديدة الحساسية للبنسلينات.
- لا يستخدم في الدواجن المنتجة للبيض للاستهلاك البشري.

### آثار جانبية:

في بعض الأحيان قد تحدث اضطرابات في الجهاز الهضمي أو تفاعلات فرط الحساسية للبنسلين أو تفاعلات حساسية جلدية.

### عدم التوافق مع أدوية أخرى:

لا يُستخدم مع الأدوية المضادة للميكروبات البكتيرية.

### فترة سحب العلاج:

لاستهلاك اللحوم:

العجول: يومان، الدواجن: يوم واحد.

التخزين: يحفظ في مكان جاف معتم وبدرجة حرارة أقل من 30°م.

العبوات: (100، 250، 500، 1000) غم.

للاستخدام البيطري فقط