

فازوريل 5%

(سائل معلق)
للحملان و العجول

التركيب: كل مل يحتوي على:-

50 ملغم

تولترازوريل

الإستطبابات:

- الحملان: الوقاية من العلامات السريرية للكوكسيديا وتقليل تناثر الكوكسيديا في الحملان في المزارع ذات حالات مرضية سابقة مؤكدة من الكوكسيديا الناجم عن ايميريا كرناليس و ايميريا اوفينوداليس .
- العجول: الوقاية من العلامات السريرية للكوكسيديا وتقليل تناثر الكوكسيديا في العجول التي تحل محل الابقار المنتجة للحليب المخصص للاستهلاك البشري، في المزارع ذات حالات مرضية سابقة مؤكدة من الكوكسيديا الناجم عن ايميريا بوفيس و ايميريا زورني.
- الجرعات: رج العبوة جيداً قبل الاستعمال.

الحملان: جرعة واحدة عن طريق الفم تعادل 0.4 مل معلق لكل كغم من وزن الجسم (20 ملغم تولترازوريل / كغم من وزن الجسم).

العجول: جرعة واحدة عن طريق الفم تعادل 3.0 مل معلق لكل 10 كغم من وزن الجسم (15 ملغم تولترازوريل / كغم من وزن الجسم).

فترة الأمان:

العجول: 63 يوماً ، لا يسمح باستعمالها في الحيوانات الحلوب المنتجة للحليب المعد للاستهلاك البشري.

الحملان: اللحوم ومشتقاتها: 42 يوماً ، لا يسمح باستخدامها في الأغنام المرضعة المنتجة للحليب المعد للاستهلاك البشري.

موانع الاستعمال:

- لا تستخدم في العجول التي يزيد وزنها عن 80 كجم من وزن الجسم.
- لا تستخدم في وحدات التسمين مثل العجول اللاحمة.

احتياطات:

- الاستخدام المتكرر لمضادات الطفيليات من نفس المجموعة تؤدي إلى تطوير المقاومة.
- تجنب ملامسة الجلد وتخلص من الأدوية غير المستخدمة.
- التخزين: يحفظ في مكان جاف و معتم بدرجة حرارة أقل من 30 درجة مئوية.

للاستعمال البيطري فقط