

المجموعة:
Triazole

بنزوفاب-١٠%

مبيد فطري

مركز قابل للاستحلاب



مبيد فطري جهازى واسع النطاق لمكافحة البياض الدقيقي على المحاصيل المذكورة في جدول الاستخدامات.

التركيب : كل لتر يحتوي على:

١٠ % و/ح (مادة فعالة)

بينكونازول

الخواص :

بنزوفاب-١٠ % : مبيد فطري جهازى وقائى وعلاجى، يتم امتصاصه عن طريق الأوراق، ويتم انتقاله بشكل

أكروبيتي (ينتقل من القاعدة نحو القمة أو من الأسفل إلى الأعلى) في النسيج الخشبي.

بنزوفاب-١٠ % : يحمي المحصول من فقدان الإنتاجية والجودة بسبب المرض.

بنزوفاب-١٠ % : ينبغي تطبيقه كإجراء وقائى لمكافحة الأمراض. حيث أن مكافحة المرض المنتشر يعتبر أكثر صعوبة

في السيطرة عليه وربما يكون المرض قد خفض حيوية ونشاط المحصول المعامل.

الاستعمالات :

المحصول	المرض	معدل الاستعمال ٢٠ / لتر ماء	الحد الأقصى للتطبيقات لكل موسم / الفترة بين الرشات	وقت التطبيق	فترة الامان (أيام)
التفاح، الأجاص السفرجل	البياض الدقيقي	٥-١٠ مل	٣ تطبيقات بفاصل زمني ١٢-١٤ يوم	من مرحلة بدء تكون الثمرة حتى تصل الثمرة إلى ٨٠٪ من حجمها النهائي.	١٤
الخوخ، المشمش، الدراق	البياض الدقيقي	٦ مل	تطبيقين بفاصل زمني ١٢-١٤ يوم	من مرحلة بدء النمو إلى مرحلة نضج الثمار.	١٤
العنب	البياض الدقيقي	٦ مل	٣ تطبيقات بفاصل زمني ١٤-١٠ يوم	من الإزهار إلى مرحلة إغلاق العناقيد.	١٤
الضراوة	البياض الدقيقي	١٠ مل	تطبيقين بفاصل زمني ١٠-١٤ يوم	من بداية نمو الستيرونات (حوالي ٢ سم) حتى الحصاد.	٣
الخيار، البطيخ، الشمام، اليقطين، القرع، الكوسا	البياض الدقيقي	٧-١٠ مل	تطبيقين بفاصل زمني ١٠-١٤ يوم	من بداية الإزهار إلى الحصاد.	٣
الفاصوليا الباذنجان البندورة	البياض الدقيقي	٧-١٠ مل	تطبيقين بفاصل زمني ١٠-١٤ يوم	من ظهور الزهرة الخامسة إلى الحصاد. من بداية الإزهار إلى الحصاد. من تطور النموات الجانبية الأولى للحصاد.	٣
التوت	البياض الدقيقي	٨ مل	تطبيق واحد	ينطبق حتى الحصاد.	٣
الباميا	البياض الدقيقي	٧-١٠ مل	تطبيقين بفاصل ١٠ أيام	من تفتح الزهرة الأولى إلى الحصاد.	٧
الورد، بيجونيا الداليا، القطيفة، الأقحوان، البيلارجونيوم، القرنفل، (الببوة المحمية)	البياض الدقيقي	٧-١٠ مل	تطبيقين بفاصل زمني ٧-١٠ يوم	من تطور الورقة الحقيقية الثالثة / الزهرة إلى نضج البذور / الثمار.	---
أشجار الزينة	البياض الدقيقي	٧-١٠ مل	٣	التطبيق في الربيع إلى الخريف.	---

• للحصول على معلومات عن الإسعافات الأولية والتحديثات راجع الفهرس الخاص بذلك في نهاية الكتاب.

تحذير:

- عدم استعمال المبيد الا على المحاصيل الواردة في جدول الاستعمالات مع الالتزام بفترات الأمان قبل عملية القطف.
- لا ينطبق على المحاصيل المعدة للتصنيع (البندورة والفراولة).
- لتجنب تطور المقاومة، يجب ألا يتجاوز الرش بمبيدات الفطريات DMIS الذي يشمل (التريازولات والإيميدازولات) ٥٠٪ من إجمالي التطبيقات.
- إذا حدث هطول الأمطار خلال ساعة واحدة من التطبيق، فمن الضروري إعادة التطبيق.
- يجب أن تكون سرعة الرياح أثناء التطبيق أقل من ١٨ كم/ساعة لتجنب الانجراف. تسمح الرطوبة العالية ودرجات الحرارة المنخفضة (١٠ - ٢٠ درجة مئوية) بامتصاص أفضل لقطرات الرذاذ.

فترة تحريم دخول المنطقة المعاملة:

يمنع دخول المنطقة المعاملة قبل مرور ٢٤ ساعة على آخر معاملة رش.

قابلية الخلط:

قابل للخلط مع معظم المبيدات، وينصح بعمل تجربة خلط مصغرة قبل التطبيق.